

明尼吉柚(紅柑)炭疽病-20140507

【樣品來源】

2014年5月7日雲林縣古坑鄉

【病徵描述及診斷結果】

葉片上有不規則形略為凹陷褐色斑點，帶有黃暈，若仔細觀察可看見病斑中的輪紋，遭受感染之葉片易落葉，經分離培養病原菌診斷為炭疽病。

【炭疽病管理重點】

1. 健康種苗。
2. 病原菌可在被害植物體內殘存，因此應注重園區衛生，隨時清除罹病組織，可減少園區內的感染源，若清運不便，可用大垃圾袋將病葉收集後綁緊，置於陽光下利用高溫殺菌。
3. 溼度高時易發生，避免過於密植，注意整枝修剪，保持良好排水與乾燥通風，減少感染機會。
4. 合理化施肥，避免氮肥過量。
5. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網[柑桔類炭疽病](#)用藥，或連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之果樹-柑橘類病蟲害防治藥劑（可參考[瘡痂病](#)、[黑星病](#)或[黑點病](#)用藥）；不同作用機制代號藥劑應各別輪流使用，勿一次同時使用多種殺菌劑，以免使病原菌產生抗藥性；施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。



不規則形略為凹陷褐色斑點，帶有黃暈



帶有病原菌的落葉，是果園內的感染源