

萬代蘭灰黴病-20160328

【樣品來源】

2016年3月28日臺南市六甲區

【病徵描述及診斷結果】

本案例為蘭花灰黴病之初期病徵，初期可見針狀黑褐色小斑點散布於花瓣上，稍大的斑點呈現水浸狀，略有濕潤感，且病斑漸趨不規則形而癒合成一大片，若將罹病組織密封於塑膠袋內，在高濕度下會產生深灰色黴狀物，即為病原菌孢子，可隨風或水滴噴濺飛散傳播，依病徵及病原菌培養結果診斷為萬代蘭灰黴病。

【蘭花灰黴病管理重點】

1. 注意園區衛生，一發現罹病株應馬上清除，以減少感染源。
2. 園區內有此病害發生時，盡量避免噴灌，以免加速傳播。
3. 防治藥劑請參考植物保護手冊之「觀賞花卉灰黴病」：40%滅派林水懸劑 4000 位(施藥時加展著劑「組展」5000 倍)、62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑 1500 倍、50%護汰寧水分散性粒劑 1500 倍、37.4%派美尼水懸劑 1500 倍。藥劑使用前應先行作小面積之藥害測試。

<http://www.tactri.gov.tw/wSite/ct?xItem=3691&ctNode=333&mp=11#cat5>

