

## 紅龍果莖潰瘍病-20160701

### 【樣品來源】

2016年07月01日臺南市新化區

### 【病徵描述及診斷結果】

罹病果實表面有黃橘色病斑，嚴重時變成褐色木栓化組織，病組織上有小黑點，內含許多分生孢子，經顯微鏡鏡檢後診斷為紅龍果莖潰瘍病。

### 【潰瘍病管理重點】

1. 目前紅龍果莖潰瘍病目前尚無推薦藥劑可供使用，請參考炭疽病藥劑防治。防治藥劑請參考植物保護手冊，或連結本場網站查詢農作物推薦用藥，

[http://www.tndais.gov.tw/htmlarea\\_file/web\\_articles/tndais/2566/pitaya-1051226.pdf](http://www.tndais.gov.tw/htmlarea_file/web_articles/tndais/2566/pitaya-1051226.pdf)

施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

2. 繁殖時請選擇健康無此菌感染之莖節做為種苗，以避免成為感染源。

3. 清除罹病植株及果實，移出園區外銷毀。

4. 使植株間通風良好、日照充足，並適當修剪枝條，減少病原菌傳播。



果實表面有黃橘色病斑，病組織上有小黑點