

甜椒棉蚜-20160606

【樣品來源】

2016年6月6日台南市新化區

【病徵描述及診斷結果】

棉蚜分泌的蜜露導致葉片煤煙病，黑色具黏性，影響植株光合作用與正常生長。

【管理重點】

1. 煤煙病危害嚴重的葉片，或佈滿蟲體的葉片，摘除後帶離園區，減少病蟲源的孳生。
2. 甜椒連續採收時期，可參考使用非化學農藥防治資材，例如純度較高之礦物油或乳化之油劑(如 99%礦物油、苦楝油或保護露..等)，先以稀釋 500 倍測試適當倍數，以不造成藥傷為主，高溫下易藥害，儘量於傍晚溫度較涼爽時施用。
3. 參考使用登記於甜椒**蚜蟲類**、**粉虱類**或**薊馬類**([甜椒果菜類 薊馬類](#)、[甜椒果菜類 葉部薊馬類](#)、[甜椒 薊馬類](#))之藥劑，依照使用方法施用並注意安全採收期，亦可連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之<甜椒病蟲害防治藥劑 1100708 >。

<p>棉蚜蜜露導致煤煙病</p>	<p>深色點狀為棉蚜，喜棲息於葉背</p>
<p>棉蚜</p>	