

番石榴小黃薊馬-20131114

【樣品來源】

2013年11月14日嘉義縣民雄鄉

【病徵描述及診斷結果】

套袋果實上出現條狀的褐色疤痕，為小黃薊馬危害。小黃薊馬於套袋時一併包入，於袋中存活繼續危害果實，並沿保麗龍網套取食，挫傷果皮吸食汁液，留下分佈規則的疤痕。通常於這類果實上與其套袋中仍可見到許多薊馬蟲體。

【番石榴小黃薊馬管理重點】

1. 小黃薊馬危害嫩葉、花及幼果，花期即要注意田間薊馬發生狀況，可吊掛黃色黏板監測密度，適時進行防治。
2. 套袋前需徹底防治果實上的害蟲，避免將其套入袋中繼續危害。
3. 小黃薊馬世代短，每次施藥採用不同作用機制藥劑輪流使用，可降低其抗藥性產生機會。
4. 防治藥劑及藥劑作用機制可參考農藥資訊服務網：[番石榴薊馬類](#)登記用藥，或連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之果樹-番石榴病蟲害防治藥劑，施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。



小黃薊馬在套袋中取食留下網狀的痕跡