

甜瓜細菌性果斑病-20131231

【樣品來源】

2013 年 12 月 31 日嘉義縣太保市

【病徵描述及診斷結果】

果實表面出現小型不規則水浸狀深褐色或橄欖色病斑，略有乳白色菌泥泌出，剖開後果肉組織已呈水浸狀腐爛。經鏡檢診斷為瓜類細菌性果斑病。

【細菌性果斑病管理重點】

1. 帶菌種子及種苗為本病害主要的初次感染源，種植時應使用健康種子及種苗，病田不可採種。
2. 注意園區衛生，隨時清除罹病葉片及果實，以減少感染源。
3. 避免噴灌給水，減少病原菌傳播。
4. 種子消毒：種子以 1% 鹽酸浸漬 20 分鐘後，以清水流洗 20 分鐘、風乾後播種，可以降低發病率。
5. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網：[瓜果類細菌性斑點病](#)登記用藥，或連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之蔬菜〈香瓜、洋香瓜、西瓜病蟲害防治藥劑〉，施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

	
果實表面呈不規則形水浸狀褐色或橄欖色病斑，病斑形態隨瓜類品種不同略有差異	雖然果皮上之病斑不大，但果實內已完全呈水浸狀腐敗