

柑桔炭疽病-20130422

【樣品來源】

2013年4月22日雲林縣斗六市

【病徵描述及診斷結果】

柑桔嫩葉上水浸狀病斑，逐漸擴大為直徑2-3公分轉為黑褐色同心輪紋狀斑，病斑癒合呈不規則形，經鏡檢可見到病斑上產生粉色分生孢子堆及炭疽病菌的分生孢子。

【柑桔炭疽病管理重點】

1. 本病害主要為害新梢、嫩葉及果實，亦可感染葉柄、果梗及枝條，行潛伏感染於果實成熟或葉片老化樹勢衰弱時出現病徵。但新稍嫩葉幼果期感染仍可見病斑。病原菌藉雨水傳播，雨季時宜注意防治。
2. 病原菌會殘存於枝條與病葉，休眠期修剪枝條時，儘可能將罹病枝葉剪除並移出果園，以減少園區感染源。
3. 適度修剪枝葉避免生長過度茂密，保持園區光照及通風良好。合理施肥使植物生長正常，樹勢強健增加植物抵抗力。
4. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網：[柑桔類炭疽病](#)登記用藥，或連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之果樹-柑橘類病蟲害防治藥劑，施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

	
柑桔炭疽病於嫩葉上的病徵	病斑呈同心輪紋狀，可見到粉色的分生孢子堆