

明尼吉柚(紅柑)潰瘍病-20140507

【樣品來源】

2014年5月7日雲林縣古坑鄉

【病徵描述及診斷結果】

葉片上有略微隆起、用手觸摸感覺粗糙之木栓化褐色小點，周圍呈暗綠色水浸狀，帶有黃暈；較大之病斑會相互癒合成不規則形，中央常破裂凹陷，經病徵觀察及顯微鏡鏡檢診斷為柑橘潰瘍病。

【柑橘潰瘍病管理重點】

1. 強風地區避免種植感病品種。
2. 於休眠及花芽分化期徹底進行整枝修剪，罹病枝條應先行剪除後搬離果園，減少感染機會。
3. 迎風面可種植防風林
4. 合理化施肥，勿施用過多氮肥，以免延緩葉片成熟，而延長感染時期。
5. 春芽萌發前灑佈4-4式波爾多液一至二次。
6. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網：[柑桔類潰瘍病](#)登記用藥，或連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之果樹-柑橘類病蟲害防治藥劑，不同作用機制代號藥劑應各別輪流使用，勿一次同時使用多種殺菌劑，以免使病原菌產生抗藥性；施藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。



及早發現病斑可掌握防治先機



隆起之木栓化病斑，帶有水浸狀及黃暈