

甜椒側多食細蟎-20160719

【樣品來源】

2016年7月19日台南市新化區

【病徵描述及診斷結果】

側多食細蟎危害多種農作物，體型細小約 100-300 μm ，喜棲息於嫩葉葉背吸食植株，造成新芽皺縮。

【管理重點】

1. 甜椒連續採收時期，可參考使用有機資材：
 - (1)純度較高之油劑：99%礦物油、苦楝油或保護露..等。
 - (2)可濕性硫磺粉：勿與油劑、銅劑或肥料混合使用，建議單獨使用。
 - (3)油劑與硫磺粉先以稀釋 500 倍測試適當倍數，以不造成藥傷為主，高溫下易藥害，儘量於傍晚溫度較涼爽時施用。
2. 防治藥劑請參考農藥資訊服務網登記於[甜椒細蟎類](#)或[甜椒葉蟎類](#)之藥劑，或連結本場網站查詢[農作物登記用藥](#)之〈甜椒病蟲害防治藥劑〉。依照使用方法施用並注意安全採收期。



葉背散佈細小顆粒狀為細蟎



細蟎危害造成新芽皺縮



細蟎



臺南場農作物病蟲害診斷服務專欄

臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室

<https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=7>