



## 高粱病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
胡麻葉枯病	25%普克利乳劑	1,300	9	3, G1
穗腐病	50%依普同可溼性粉劑	1g/公斤種子	-	2, E3
	21.2%依滅列乳劑	0.5 公撮/公斤種子	-	3, G1
玉米螟	100g/L 氟芬隆水分散性乳劑	3,000	7	15
	9.6%氟芬隆水分散性乳劑	3,000	7	15
夜蛾類	50%加保利可溼性粉劑	500	-	1A
	85%加保利可溼性粉劑	850	-	1A
	39.5%加保利水懸劑	400	-	1A
	40%加保利水懸劑	400	-	1A
	44.1%加保利水懸劑	450	-	1A
	11.7%賜諾特水懸劑	1,200	9	5
	5.87%賜諾特水懸劑	600	9	5
	22.6%滅芬諾水懸劑	2,000	21	18
甜菜夜蛾	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	每公頃 500 條	-	-
	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	每公頃設置 11-18 個點	-	-
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	每公頃設置 7 組	-	-
蚜蟲類	2.4%第滅寧水懸劑	1,000	7	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1,000	7	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	7	3A
	25%賽速安水溶性粒劑	5,000	7	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	2,000	7	4A
高粱蚜	75%毆殺松水溶性粒劑	1,500	15	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	75%毆殺松水溶性粉劑	1,500	15	1B
	25%納乃得水溶性粉劑	900	15	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1,500	15	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1,500	15	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1,500	15	1A
秋行軍蟲	5.87%賜諾特水懸劑	600	9	5
	11.7%賜諾特水懸劑	1,200	9	5
	100g/L 諾伐隆水分散性乳劑	1,500	10	15
	18.4%剋安勃水懸劑	2,500	14	28
	5%護賽寧溶液	800	15	3A
	10%依芬寧乳劑	750	15	3A
	20%依芬寧可溼性粉劑	1,500	15	3A
	75%硫敵克可溼性粉劑	每公頃使用 250 克混合 10-15 公斤 米糠與 1 公 斤蔗糖之餌 料	-	1A
	48.1%鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	1,000	-	11A
54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散 性粒劑	1,000	-	11A	
毒蛾類	22.6%滅芬諾水懸劑	2,000	21	18
螟蛾類	11.7%賜諾特水懸劑	1,200	9	5
	5.87%賜諾特水懸劑	600	9	5
鱗翅目 害蟲	20%依芬寧可溼性粉劑	1,500	15	3A
	10%依芬寧乳劑	750	15	3A
	85%(32,000 IU/MG)庫斯蘇力	3,000	-	11A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	菌 SA-11 水分散性粒劑			
	100g/L 諾伐隆水分散性乳劑	1,500	10	15
切根蟲	5%陶斯松粒劑	20 公斤/公頃	定植前 3 天施藥	1B
雜草	960 G/L (96% W/V)左旋莫多草乳劑	1.2 公升/公頃	高粱種子及幼苗對除草劑極為敏感，勿任意提高用藥量，以免發生藥害。整地後，土壤表面濕時，藥液均勻噴施於土壤表面後 7 日播種。	
	34%施得圃乳劑	1.5 公升/公頃		

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

112.1.12 整理