



竹筍病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
竹細菌性萎凋病	85%邁隆可濕性粉劑 (自產筍期前一個月開始,至收穫完畢為止,每隔 15 天施藥 1 次)	500 倍, 4 公升/平方公尺	-	8F
竹象鼻蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6 天	4A
竹捲葉蟲	5.7%賽扶寧乳劑	250	9	G1
蚜蟲類(竹葉扁蚜、竹莖扁蚜)	0.5%可尼丁粒劑	90 公斤/公頃	3	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	6	4A
	5%賽扶寧水基乳劑	2000	9	3A
	5.7%賽扶寧乳劑	2000	9	3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	21	3A
竹盲椿象(竹蚊、青炆)	30%撲芬松乳劑	1,500	-	E3, 1B
	20%芬化利乳劑	2,000	-	3A

1. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。
2. 其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
3. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1.2 版 103.02.21 更新

1.3 版 105.12.16 更新