



胡瓜、花胡瓜病蟲草害防治藥劑

113.04.26 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	23.2% 賓克隆水懸劑	1000	播種期施用	20
	25% 賓克隆水懸劑	1000	播種期施用	20
	25% 賓克隆可濕性粉劑	1000	播種期施用	20
	2X10 ⁸ CFU/g 綠木黴菌 R42(其他)粉劑	-	-	BM02
立枯病	30% 殺紋寧溶液	1000	苗床使用	32
	45% 殺紋依得利可濕性粉劑	1,500	苗期使用	14, 32
幼苗疫病	39.5% 普拔克溶液	200	穴盤苗使用	28
	66.5% 普拔克溶液	400	穴盤苗使用	28
疫病	10% 亞托敏水懸劑	400	6	11
	1X10 ⁷ CFU/g 蓋棘木黴菌 ICC080/012 可濕性粉劑	2,000	-	BM02
	2.5% 右滅達樂粒劑	20 公斤/ 公頃	定植前	4
	2.5% 右滅達樂粒劑	40 公斤/ 公頃	定植後 21 天	4



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	23% 亞托敏水懸劑	1,000	6	11
	25% 依得利乳劑	1500	6	14
	250g/L(25%w/v)亞托敏水懸劑	1,000	6	11
	35% 依得利可濕性粉劑	2000	6	14
	50% 亞托敏水分散性粒劑	2,000	6	11
	50% 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50% 達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500 g/L (50% w/v)達滅芬水懸劑	3000	6	40
	60% 免得克敏水分散性粒劑	800	9	M3, 11
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1000	6	43, 28
	9.4% 賽座滅水懸劑	3000	3	21
露菌病	10% 亞托敏水懸劑	800	6	11
	17.7% 安美速水懸劑	4000	3	21
	17.7% 安美速水懸劑	4000	3	21
	18.7% 達滅克敏水分散性粒劑	1,000	12	11, 40



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	1x10 ⁹ CFU/g 以上液化澱粉芽孢桿菌 QST713 水懸劑	400	-	BM02
	23% 亞托敏水懸劑	2000	6	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	6	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	6	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	6	11
	23.6% 百克敏水懸劑	3,000	12	11
	23.6% 百克敏乳劑	3,000	12	11
	250g/L(25%w/v)亞托敏水懸劑	2000	6	11
	250g/L(25%w/v)曼普胺水懸劑	2,500	6	40
	27.12% 三元硫酸銅水懸劑	800	-	M1
	33.5% 快得寧水懸劑	600	12	M1
	34% 鹼氯氫氧銅水懸劑	600	-	M1
	35% 達滅克絕可濕性粉劑	1,500	6	40, 27
	350g/L(35%w/v)達滅克絕水懸劑	1,500	6	40, 27



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	36% 波爾多水懸劑	200	-	M1
	39% 硫酸快得寧可濕性粉劑	400	4	M1, M1
	39.5% 普拔克溶液	400	15	28
	40% 四氯異苯腈水懸劑	200	14	M5
	40% 四氯異苯腈水懸劑	1,000	14	M5
	40% 快得寧水分散性粒劑	750	12	M1
	40% 快得寧可濕性粉劑	750	12	M1
	50% 1X10 ⁹ CFU/g 以上枯草桿菌 Y1336 可濕性粉劑	800	-	BM02
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4000	6	11
	50% 枯草桿菌 Y1336 可濕性粉劑	800	-	BM02
	50% 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50% 達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	6	40



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	52.5% 凡殺克絕水分散性粒劑	2500	15	11, 27
	525g/L(52.5%w/v)達滅脫定水懸劑	1,000	6	45, 40
	53% 鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	7	M3, 4
	54% 快得滅達樂可濕性粉劑	400	6	M1, 4
	55% 脞硫醃銅可濕性粉劑	500	7	M9, M1
	560g/L(56%w/v)四氯托敏水懸劑	1000	7	M5, 11
	58% 鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	7	M3, 4
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1500	6	43, 28
	64% 甲鋅毆殺斯可濕性粉劑	400	6	M3, 4
	66.5% 普拔克溶液	800	15	28
	70% 四氯賽得可濕性粉劑	800	6	M5, P07



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	72% 波爾多可濕性粉劑	400	-	M1
	75% 四氯異苯腈水分散性粒劑	500	14	M5
	75% 四氯異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	500	14	M5
	75% 四氯異苯腈可濕性粉劑	500	14	M5
	75% 免得克絕可濕性粉劑	750	3	M3, 27
	75% 鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1000	3	M3, 22
	77.5% 嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	-	24, M1
	80% 免得爛水分散性粒劑	500	6	M3
	80% 快得寧可濕性粉劑	1500	12	M1
	80% 福賽快得寧可濕性粉劑	1500	9	P07, M1
	80% 錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	9.4% 賽座滅水懸劑	3000	3	21
	白粉病	10% 菲克利水懸劑	4000	14
10% 菲克利乳劑		4000	14	3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%保粒黴素甲可濕性粉劑	1000	-	19
	10.5% 平克座乳劑	3000	3	3
	11.76% 芬瑞莫乳劑	10000	3	3
	11.8% 護汰芬水懸劑	2000	7	3
	125g/L(12.5 w/v)亞派占乳劑	2000	3	7
	125g/L(12.5%w/v)氟殺待克利水懸劑	2,000	5	7, 3
	13.4% 邁克尼水基乳劑	4000	3	3
	13.4% 邁克尼乳劑	4000	3	3
	18.4% 賽福芬胺水分散性粒劑	2000	6	U6, 3
	19% 平克座水基乳劑	6000	3	3
	21.4% 硫酸銅水懸劑	500	6	M1
	23% 菲克利水懸劑	9000	14	3
	25% 蟬離丹可濕性粉劑	1000	7	un
	25% 布瑞莫乳劑	3000	3	8
	25% 平克座水分散性粒劑	7000	3	3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25% 依瑞莫水懸劑	1500	7	8
	25.9% 得克利水基乳劑	3,000	6	3
	250g/L(25%w/v)布瑞莫乳劑	3000	3	8
	250g/L(25%w/v)得克利水基乳劑	3,000	6	3
	26.8% 派芬農水懸劑	3000	3	50
	27.3% 白列克收欣水懸劑	1,200	6	7, 11
	30% 賽福座可濕性粉劑	3000	3	3
	40% 克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1500	6	M7
	40% 邁克尼可濕性粉劑	12000	3	3
	400g/L(40%w/v)滅芬座水懸劑	2,500	4	3
	42.37% 滅芬農水懸劑	4,000	3	50
	42.4% 白克列水懸劑	2000	6	7
	5% 三泰芬可濕性粉劑	2000	3	3
	5% 菲克利水懸劑	2000	14	3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 白克列水分散性粒劑	2500	6	7
	50% 克收欣水分散性粒劑	3,000	6	11
	50% 賽普洛水分散性粒劑	1,500	6	9
	50%保粒黴素甲水溶性粒劑	5000	-	19
	500g/L(50%w/v)三氟派瑞水懸劑	9,000	3	7, 11
	500g/L(50%w/v)氟殺克敏水懸劑	5,000	5	7, 11
	52% 可濕性硫黃水懸劑	650	-	M2
	75% 可濕性硫黃可濕性粉劑	950	-	M2
	80% 可濕性硫黃水分散性粒劑	1000	-	M2
	80% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1000	-	M2
	80% 碳酸氫鉀水溶性粉劑	1000	-	
	84.2% 三得芬乳劑	3500	9	5
	90% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1150	-	M2
	95% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	-	M2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	95% 礦物油乳劑	500	-	NC
	97% 礦物油乳劑	500	-	NC
	99% 礦物油乳劑	500	-	NC
細菌性斑點病	1x10 ⁹ CFU/g 以上貝萊斯芽孢桿菌 BACY 可濕性粉劑	600	-	BM02
	40% 銅快得寧可濕性粉劑	500	3	M1
炭疽病	10% 待克利水分散性粒劑	1,200	9	3
	1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
	22.7% 腈硫醃水懸劑	700	7	M9
	23.6% 百克敏水懸劑	3,000	12	11
	23.6% 百克敏乳劑	3,000	12	11
	24.9% 待克利水懸劑	3,000	9	3
	24.9% 待克利乳劑	3,000	9	3
	250g/L(25%w/v)待克利乳劑	3,000	9	3
	27.3% 三氟得克利水懸劑	2,500	7	11,3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40% 四氯異苯腈水懸劑	320	14	M5
	42.2%腈硫醃水懸劑	1500	7	M9
	500g/L(50%w/v)三氟派瑞水懸劑	2,500	7	7,11
	500g/L(50%w/v)氟殺克敏水懸劑	2,500	5	7, 11
	70% 腈硫醃水分散性粒劑	2000	7	M9
	70%腈硫醃可濕性粉劑	2000	7	M9
	70% 四氯保淨可濕性粉劑	500	6	1, M5
	75% 四氯異苯腈水分散性粒劑	600	14	M5
	75% 四氯異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	600	14	M5
	75% 四氯異苯腈可濕性粉劑	600	14	M5
蔓枯病	11.3% 保粒黴素丁水分散性粒劑	2000	-	19
	23% 亞托敏水懸劑	4000	6	11



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	250g/L(25%w/v)亞托敏水懸劑	4000	6	11
	3% 甲基多保淨軟膏劑	-	6	1
	43.7% 三氟敏水懸劑	4,000	7	11
	47% 保粒保淨可濕性粉劑	1000	6	19, 1
	50% 三氟敏水分散性粒劑	4,000	7	11
	50% 撲滅寧水懸劑	2,000	3	2
	50% 撲滅寧可濕性粉劑	2,000	3	2
	500g/L(50%w/v)三氟敏水懸劑	4,000	7	11
萎凋病	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可濕性粉劑	200	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 T 濃餌劑 a05 可濕性粉劑	250	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 菌 PMB01AL	200	-	BM02
	1x10 ⁹ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 菌 T 濃餌劑 a05 水懸劑	250	-	BM02



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
灰黴病	1×10 ⁸ CFU/mL 以上液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400	-	BM02
	1×10 ⁹ CFU/mL 以上液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	-	BM02
地下線蟲	5% 毆殺滅粒劑	40-80 公斤/公頃	移植當日	1A
根瘤線蟲	400g/L(40%w/v)氟派瑞水懸劑	3,000	定植時澆灌	7
	480g/L(48%w/v)氟速芬乳劑	6 公升/公頃(加水至 500 公升)	種植前 7 天施用	
	500g/L(50%w/v)氟派瑞水懸劑	4,000	定植時澆灌	7
瓜實蠅	0.02% 賜諾殺濃餌劑	2	-	5
	25% 馬拉松可濕性粉劑	400	7	1B
	50% 馬拉松水基乳劑	800	7	1B
	50% 馬拉松可濕性粉劑	800	7	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 馬拉松乳劑	800	7	1B
	85% 克蠅香溶液	10-20個/ 公頃	-	
	95% 克蠅溶液	10 至 20 個/公頃	-	
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 組/公頃	-	
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	5 至 10 個/公頃	-	
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	設置 11-18 個 點/公頃	-	
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公 頃	-	
夜蛾類	1% 賽洛寧可濕性粉劑	400	10	3A
	10% 克凡派水懸劑	1,000	6	13
	10% 賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	100g/L(10%w/v)氟芬隆水分散性乳劑	3,000	6	15
	13.5% 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	18.4% 剋安勃水懸劑	2500	3	28
	19.2g/L(1.92%w/v)因滅汀乳劑	2,000	6	6
	19.7% 得芬諾水懸劑	2,000	6	18
	2.15% 因滅汀水基乳劑	2,000	6	6
	2.15% 因滅汀水懸劑	2,000	6	6
	2.15% 因滅汀乳劑	2,000	6	6
	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	1,000	10	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	1,000	10	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	1,000	10	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	1,000	10	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	22% 美氟綜水懸劑	1,000	3	22B
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	1500	6	3A
	25% 二福隆水懸劑	1500	14	15
	25% 二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
	25% 馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	35% 剋安勃水分散性粒劑	5000	3	28
	40% 益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B, 3A
	5% 因滅汀水溶性粒劑	5,000	6	6
	5% 因滅汀乳劑	5,000	6	6
	5% 克福隆乳劑	2000	15	15
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	2,000	10	3A
	5% 賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	50% 馬拉松水基乳劑	500	4	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50% 馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	50% 馬拉松乳劑	500	4	1B
	58% 乃力松乳劑	1000	4	1B
	70% 得芬諾可濕性粉劑	7,000	6	18
	75% 硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	9.6% 氟芬隆水分散性乳劑	3,000	6	15
毒蛾類	25% 二福隆水懸劑	1500	14	15
	25% 二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
鱗翅目 害蟲	10% 芬化利乳劑	1500	7	3A
	150g/L(15%w/v)賽洛安勃膠囊 水懸混劑	4,000	3	3A, 28
	20% 芬化利水基乳劑	3000	7	3A
	20% 芬化利可濕性粉劑	3000	7	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	7	3A
	25% 納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	35	1A
	5% 芬化利乳劑	750	7	3A
	54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1,000	-	BM02, 11A
	54%庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	-	BM02, 11A
	6% 苦參鹼溶液	1000	-	
	75% 硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
葉蟎類	1% 密滅汀乳劑	1,500	3	6
	10% 芬殺蟎乳劑	3,000	10	21A
	15% 亞醯蟎水懸劑	1500	6	20B
	15% 芬殺蟎水懸劑	3,000	10	21A
	18.3% 芬殺蟎水懸劑	3,000	10	21A
	20% 賽芬蟎水懸劑	1000	7	25A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	240g/L(24%w/v)賜滅芬水懸劑	2,000	3	23
細蟎類	5% 芬普蟎水懸劑	2000	7	21A
二點葉蟎	1% 密滅汀乳劑	1,500	3	6
蚜蟲類	10% 氟尼胺水分散性粒劑	4,000	3	29
	10% 賽速安水溶性粒劑	2000	6	4A
	25% 派滅淨可濕性粉劑	2,000	6	9B
	25% 賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	250g/L(25%w/v)派滅淨水懸劑	2,000	6	9B
	50% 派滅淨水分散性粒劑	4,000	6	9B
	6% 苦參鹼溶液	1500	-	
棉蚜	25% 派滅淨可濕性粉劑	2,000	6	9B
	250g/L(25%w/v)派滅淨水懸劑	2,000	6	9B
	50% 派滅淨水分散性粒劑	4,000	6	9B
斑潛蠅	43% 佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	75% 賽滅淨可濕性粉劑	7,500	7	17



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	8.9% 賽滅淨溶液	900	7	17
薊馬類	1% 賽洛寧可濕性粉劑	700	7	3A
	10% 克凡派水懸劑	1,000	6	13
	11.6% 賜諾殺水懸劑	4500	3	5
	11.7% 賜諾特水懸劑	8,000	6	5
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2,000	7	3A
	2.5% 賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2,000	7	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2,000	7	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2,000	7	3A
	20% 覆滅?水溶性粉劑	600	7	1A
	43% 佈飛松乳劑	800	10	1B
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	3,500	7	3A
	5.87% 賜諾特水懸劑	4,000	6	5
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳劑	800	10	1B
	80% 賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
葉部薊馬類	18.2% 益達胺水懸劑	3000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4,000	6	4A
	28.8% 益達胺溶液	4500	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6% 益達胺溶液	1500	6	4A
南黃薊馬	18.2% 益達胺水懸劑	3000	9	4A
	2.4% 第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	2000	20	3A
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	2000	20	3A
	28.8% 益達胺溶液	4500	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6% 益達胺溶液	1500	6	4A
粉蟲類	0.5% 可尼丁粒劑	25-30 公斤/公頃	-	4A
	10% 賽速安水溶性粒劑	4000	6	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10.26% 賽安勃水分散性油懸劑	800	4	28
	100g/L(10%w/v)賜派滅水懸劑	1,000	7	23
	11% 百利普芬水基乳劑	1000	9	7C
	11% 百利普芬水懸劑	1000	9	7C
	11% 百利普芬乳劑	1000	9	7C
	150g/L(15%w/v)賜派滅水分散性油懸劑	1,500	7	23
	16% 可尼丁水溶性粒劑	3000	9	4A
	18.2% 益達胺水懸劑	3000	9	4A
	2% 益達胺粒劑	60 公斤/ 公頃	定植後畦上 施用	4A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	20% 達特南水溶性粒劑	3,000	6	4A
	21.8% 速殺氟水懸劑	2,400	6	4C



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25% 布芬淨可濕性粉劑	1,000	7	16
	25% 派滅淨可濕性粉劑	1,200	6	9B
	25% 賽速安水溶性粒劑	10000	6	4A
	250g/L(25%w/v)派滅淨水懸劑	1,200	6	9B
	28.8% 益達胺溶液	4500	9	4A
	40% 布芬淨水懸劑	1,500	7	16
	50% 速殺氟水分散性粒劑	5,500	6	4C
	9.6% 益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6% 益達胺溶液	1500	6	4A
	50g/L (5%w/v)阿扶平水分散性乳劑	1200	3	
金花蟲類	10% 芬化利乳劑	1500	7	3A
	150g/L(15%w/v)賽洛安勃膠囊水懸混劑	4,000	3	3A, 28
	20% 芬化利水基乳劑	3000	7	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20% 芬化利可濕性粉劑	3000	7	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	7	3A
	20% 達特南水溶性粒劑	3,000	6	4A
	25% 二福隆水懸劑	1500	14	15
	25% 二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
	25% 納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水溶性粉劑	1500	7	1A
	43% 佈飛松乳劑	1,000	10	1B
	5% 芬化利乳劑	750	7	3A
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳劑	1,000	10	1B
	75% 硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
植食性 瓢蟲類	150g/L(15%w/v)賽洛安勃膠囊 水懸混劑	4,000	3	3A, 28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25% 二福隆水懸劑	1500	14	15
	25% 二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
	25% 馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50% 馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	50% 馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	50% 馬拉松乳劑	500	4	1B
黃守瓜	39.5% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1% 加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50% 加保利可濕性粉劑	500-100 0	7	1A
	85% 加保利可濕性粉劑	850-170 0	7	1A
青椿象	20% 撲滅松乳劑	2.5 公升/ 公頃	10	1B
	40% 撲滅松可濕性粉劑	1.25 公斤	10	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
		/公頃		
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
生長調節劑	1.8%果收生長素溶液	6000		

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959