



<葉用甘藷> 病蟲害防治藥劑

病蟲害	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白絹病	15%福多寧乳劑	900	18	C2,7
	20%福多寧水懸劑	1200	18	C2,7
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	18	C2,7
白銹病	10%亞托敏水懸劑	900	10	C3, 11
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3, 11
	250g/L 亞托敏水懸劑	2000	10	C3, 11
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	C3, 11
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	H5, 40
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	H5, 40
	500g/L達滅芬水懸劑	3000	6	H5, 40
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M3,A1, 4
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6 天(設施12 天)	B5, F4
根腐(立枯)病	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	B4, 20
	25%賓克隆可濕性粉劑	1000	15	B4, 20
潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	9(設施15)	4A
	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6



病蟲害	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	43%佈飛松乳劑	1000	15	1B
蚜蟲類	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	9(設施15)	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	4	1A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	9	4A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A



病蟲害	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	6(設施12)	4A,3A
粉蟲類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	25%布芬淨可溼性粉劑	1500	6	16
	2%阿巴汀乳劑	1000	10	6
	50%培丹水溶性粉劑	1000	6	14
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	9	3A
	9.6%益達胺溶液	1000-1500	9	4A
	100g/L賜派滅水懸劑	1000	7	23
	150g/L賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
金花蟲、象鼻蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	9	4A
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18



病蟲害	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
夜蛾、鳥羽蛾、天蛾類 夜蛾類	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A



病蟲害	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%克福隆乳劑	2000	12	15
	10%克凡派水懸劑	1000	12	13
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	12	18
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1000	-	11
	32000IU/MG 蘇力菌水分散性粒劑	1000	-	11
	3%蘇力菌可溼性粉劑	1500	-	11
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
鱗翅目害蟲	2.15%因滅汀乳劑	1500	7	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	7	6
	19.2g/L 因滅汀乳劑	1500	7	6
	5%因滅汀乳劑	5000	7	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	7	6



病蟲害	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
甘藷蟻象	2.5% 陶斯松粉劑	45 公斤/公頃。在作畦時，來回各犁一次後，將藥劑均勻撒佈於半畦之上，再作成整畦，然後種植諸苗		1B
	使用性費洛蒙誘殺，一分地均勻設置 4 個誘蟲器，誘蟲器間相距 15 公尺。			

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

甘藷蟻象誘蟲器 金煌塑膠公司

04-23373867

性費洛蒙 藥毒所

04-23302101*829

105.12.2 整理

106.01.11 更新