



## 馬鈴薯病蟲害防治藥劑

| 病蟲害別 | 藥劑名稱               | 稀釋倍數 | 安全採收期(天)    | 作用機制代號         |
|------|--------------------|------|-------------|----------------|
| 晚疫病  | 52.5%凡殺克絕水分散性粒劑    | 2500 | 6           | C3, 27         |
|      | 23%亞托敏水懸劑          | 1000 | 7           | 11, C3         |
|      | 10%亞托敏水懸劑          | 400  | 6           | C3             |
|      | 50%亞托敏水分散性粒劑       | 2000 | 6           | C3             |
|      | 50%達滅芬可濕性粉劑        | 4000 | 7           | 40, F5         |
|      | 50%達滅芬水懸劑          | 4000 | 7           | 40, F5         |
|      | 64%鋅錳毆殺斯可濕性粉劑      | 500  | 14          | M3, A1         |
|      | 4 - 4 式波爾多液        |      | -           | M1             |
|      | 80%錳乃浦可濕性粉劑        | 400  | 7           | M3             |
|      | 83%氫氧化銅可濕性粉劑       | 400  | 7           | M1             |
|      | 63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑 | 400  | -           | M1             |
|      | 53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑    | 400  | 12          | M3, A1         |
|      | 58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑      | 400  | 12          | M3, A1         |
|      | 75%四氯異苯腈可濕性粉劑      | 600  | 7           | M5             |
|      | 75%四氯異苯腈水分散性粒劑     | 600  | 7           | M5             |
|      | 70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑      | 500  | 7           | M3             |
|      | 18.7%達滅克敏水分散性粒劑    | 1000 | 7           | F5, C3         |
|      | 80%免得爛可濕性粉劑        | 500  | 14          | M3             |
|      | 80%免得爛水分散性粒劑       | 500  | 14          | M3             |
|      | 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑       | 500  | 14          | M3             |
|      | 33%鋅錳乃浦水懸劑         | 600  | 12          | M3             |
|      | 60%免得克敏水分散性粒劑      | 900  | 14          | M3;<br>11, C3  |
|      | 525g/L 達滅脫定水懸劑     | 1000 | 6           | 40, F5; 45, C8 |
| 疫病   | 23%亞托敏水懸劑          | 1000 | 6(設施<br>12) | C3             |
|      | 10%亞托敏水懸劑          | 400  | 6(設施<br>12) | C3             |
|      | 50%亞托敏水分散性粒劑       | 2000 | 6(設施        | C3             |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱                          | 稀釋倍數  | 安全採收期(天)                  | 作用機制代號            |
|------|-------------------------------|-------|---------------------------|-------------------|
|      |                               |       | 12)                       |                   |
|      | 50%達滅芬可濕性粉劑                   | 4000  | 6(設施12)                   | F5                |
|      | 52.5%凡殺克絕水分散性粒劑               | 2500  | 6                         | 11,C3;<br>27,un01 |
|      | 60.8%氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)  | 1000  | 30                        | 43,28             |
|      | 60%免得克敏水分散性粒劑                 | 900   | 14                        | M3;<br>11,C3      |
|      | 63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑            | 400   | 鹼性氯氧化銅避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用 | M1                |
|      | 70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑                | 400   |                           | M1                |
|      | 75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑                | 500   |                           | M1                |
|      | 85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑                | 500   |                           | M1                |
|      | 1x10 <sup>7</sup> cfu/g 蓋棘木黴菌 | 2000  |                           |                   |
| 早疫病  | 9%滅特座乳劑                       | 1000  | 7                         | 3,G1              |
| 白絹病  | 50%撲滅寧可濕性粉劑                   | 2000  | 限苗期使用                     | 2, E3             |
|      | 50%福多寧可濕性粉劑                   | 5000  | 限苗期使用                     | 7, C2             |
| 白粉病  | 40%邁克尼可溼性粉劑 (提高濃度可能引起幼苗發生藥害)  | 12000 | 14                        | 3,G1              |
|      | 13.4%邁克尼乳劑                    | 4000  | 14                        | 3,G1              |
|      | 13.4%邁克尼水基乳劑                  | 4000  | 14                        | 3,G1              |
|      | 44.2%克收欣水懸劑                   | 2500  | 14                        | 11,C3             |
|      | 50%克收欣水分散性粒劑                  | 3000  | 14                        | 11,C3             |
|      | 500 g/L 氟殺克敏水懸劑               | 5000  | 7                         | 7,C2;11,C3        |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱                                            | 稀釋倍數 | 安全採收期(天)                      | 作用機制代號         |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------|
| 幼苗疫病 | 35%依得利可濕性粉劑                                     | 2000 | 播種當日使用                        | F3             |
|      | 25%依得利乳劑                                        | 1500 | 播種當日使用                        | F3             |
| 灰黴病  | 23.7%依普同水懸劑                                     | 1000 | 15                            | 2,E3           |
|      | 50%依普同可濕性粉劑                                     | 2000 | 15                            | 2,E3           |
|      | 62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑                                | 2000 | 21                            | 9,D1;<br>12,E2 |
|      | 37.4%派美尼水懸劑(高溫高濕下施用，可能引起藥斑發生)                   | 1500 | 21                            | 9,D1           |
|      | 500 g/L 氟殺克敏水懸劑                                 | 2400 | 7                             | 7,C2;11,C3     |
| 炭疽病  | 24.9%待克利乳劑 (勿提高施用劑量，以免發生藥害)                     | 3000 | 28                            | 3,G1           |
|      | 24.9%待克利水懸劑(勿提高施用劑量，以免發生藥害)                     | 3000 | 28                            | 3,G1           |
|      | 250g/L 待克利乳劑                                    | 3000 | 28                            | 3,G1           |
|      | 27.3%三氟得克利水懸劑                                   | 2500 | 21                            | 11,C3;3,G1     |
| 青枯病  | 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01<br>1x10 <sup>9</sup> CFU/mL 其他液劑 | 200  | 發病初期開始施藥，必要時每隔 7 天施藥 1 次共 5 次 |                |
|      | 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01<br>1x10 <sup>9</sup> CFU/g 可濕性粉劑 | 200  | 發病初期開始施藥，必要時每隔 7 天施藥 1 次共 5 次 |                |



| 病蟲害別   | 藥劑名稱              | 稀釋倍數     | 安全採收期(天)                   | 作用機制代號 |
|--------|-------------------|----------|----------------------------|--------|
| 細菌性斑點病 | 61.4%氫氧化銅水分散性粒劑   | 1500     | -                          | M1     |
|        | 37.5%氫氧化銅水懸劑      | 800      | -                          | M1     |
|        | 53.8%氫氧化銅水分散性粒劑   | 1200     | -                          | M1     |
|        | 57.6%氫氧化銅水分散性粒劑   | 1200     | -                          | M1     |
|        | 77%氫氧化銅水分散性粒劑     | 2000     | -                          | M1     |
|        | 77%氫氧化銅可濕性粉劑      | 2000     | -                          | M1     |
| 黑斑病    | 300 g/L 氟克殺水懸劑    | 5000     | 14                         | C2     |
| 蚜蟲     | 5%硫伐隆粒劑           | 30 公斤/公頃 | 種薯下種後施用一次                  | 1A     |
|        | 40%納乃得水溶性粉劑       | 1500     | 6                          | 1A     |
|        | 40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝 | 1500     | 6                          | 1A     |
|        | 40%納乃得水溶性粒劑       | 1500     | 6                          | 1A     |
|        | 25%納乃得水溶性粉劑       | 1000     | 6                          | 1A     |
|        | 10%賽速安水溶性粒劑       | 2000     | 14                         | 4A     |
|        | 25%賽速安水溶性粒劑       | 5000     | 14                         | 4A     |
| 切根蟲    | 0.5%芬化利粒劑         | 50 公斤/公頃 | 種植前 3 天及定植後 3 天、10 天，各施用一次 | 3A     |
|        | 3%加福松微粒劑          | 50 公斤/公頃 | 定植前 3 天施藥                  | 1B     |
| 夜蛾類    | 20%芬化利水基乳劑        | 3000     | 14                         | 3A     |
|        | 20%芬化利乳劑          | 3000     | 14                         | 3A     |
|        | 20%芬化利可濕性粉劑       | 5000     | 10                         | 3A     |
|        | 5%芬化利乳劑           | 2000     | 10                         | 3A     |
|        | 2.46%賽洛寧膠囊懸著液     | 2000     | 9                          | 3A     |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱                                 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|------|--------------------------------------|------|----------|--------|
|      | 2.5%賽洛寧微乳劑                           | 2000 | 9        | 3A     |
|      | 5%賽滅寧乳劑                              | 1500 | 7        | 3A     |
|      | 5%賽滅寧水基乳劑                            | 1500 | 7        | 3A     |
|      | 5%賽滅寧微乳劑                             | 1500 | 7        | 3A     |
|      | 5%賽滅寧可濕性粉劑                           | 1500 | 7        | 3A     |
|      | 10%賽滅寧可濕性粉劑                          | 3000 | 7        | 3A     |
|      | 75%硫敵克可濕性粉劑(避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用) | 3000 | 6        | 1A     |
|      | 5%因滅汀水溶性粒劑                           | 3500 | 14       | 6      |
|      | 2.15%因滅汀乳劑                           | 1500 | 14       | 6      |
|      | 2.15%因滅汀水基乳劑                         | 1500 | 14       | 6      |
|      | 33%佈飛百滅寧乳劑                           | 1000 | 21       | 1B,3A  |
|      | 30%佈飛賽滅寧乳劑                           | 1000 | 21       | 1B,3A  |
|      | 25%佈飛賽滅寧乳劑                           | 800  | 21       | 1B,3A  |
|      | 18.4%剋安勃水懸劑                          | 2500 | 14       | 28     |
|      | 35%剋安勃水分散性粒劑                         | 5000 | 14       | 28     |
|      | 58%乃力松乳劑                             | 1000 | 4        | 1B     |
|      | 25%二福隆可濕性粉劑                          | 1500 | 35       | 15     |
|      | 10%克凡派水懸劑                            | 1000 | 3        | 13     |
| 金花蟲類 | 25%二福隆可濕性粉劑                          | 1500 | 35       | 15     |
|      | 40%納乃得水溶性粒劑                          | 800  | 6        | 1A     |
|      | 25%納乃得水溶性粉劑                          | 800  | 6        | 1A     |
|      | 40%納乃得水溶性粉劑                          | 1500 | 6        | 1A     |
|      | 40%納乃得水溶性粉劑餌劑                        | 1500 | 6        | 1A     |
| 毒蛾類  | 33%佈飛百滅寧乳劑                           | 1000 | 21       | 1B,3A  |
|      | 30%佈飛賽滅寧乳劑                           | 1000 | 21       | 1B,3A  |
|      | 25%佈飛賽滅寧乳劑                           | 800  | 21       | 1B,3A  |
|      | 18.4%剋安勃水懸劑                          | 2500 | 14       | 28     |



| 病蟲害別   | 藥劑名稱                   | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|--------|------------------------|------|----------|--------|
| 植食性瓢蟲類 | 35%剋安勃水分散性粒劑           | 5000 | 14       | 28     |
|        | 25%二福隆可濕性粉劑            | 1500 | 35       | 15     |
|        | 25%二福隆可濕性粉劑            | 1500 | 35       | 15     |
|        | 10%芬化利乳劑               | 1500 | 14       | 3A     |
|        | 20%芬化利乳劑               | 3000 | 14       | 3A     |
|        | 20%芬化利水基乳劑             | 3000 | 14       | 3A     |
|        | 20%芬化利可濕性粉劑            | 3000 | 14       | 3A     |
|        | 5%芬化利乳劑                | 750  | 14       | 3A     |
|        | 34%硫敵克水懸劑              | 1000 | 6        | 1A     |
|        | 75%硫敵克可濕性粉劑            | 3000 | 6        | 1A     |
| 鱗翅目害蟲  | 50%培丹水溶性粉劑             | 1000 | 10       | 14     |
|        | 10%芬化利乳劑               | 1500 | 14       | 3A     |
|        | 20%芬化利乳劑               | 3000 | 14       | 3A     |
|        | 20%芬化利水基乳劑             | 3000 | 14       | 3A     |
|        | 20%芬化利可濕性粉劑            | 3000 | 14       | 3A     |
|        | 5%芬化利乳劑                | 750  | 14       | 3A     |
|        | 34%硫敵克水懸劑              | 1000 | 6        | 1A     |
|        | 75%硫敵克可濕性粉劑            | 3000 | 6        | 1A     |
|        | 54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 | 1000 |          |        |
| 粉蝨類    | 50%培丹水溶性粉劑             | 1000 | 10       | 14     |
|        | 2%阿巴汀乳劑                | 2000 | 12       | 6      |
|        | 10.4%貝賽益達胺水懸劑          | 2000 | 6        | 3A; 4A |
|        | 20%達特南水溶性粒劑            | 3000 | 3        | 4A     |
| 斑潛蠅類   | 100g/L 賜派滅水懸劑          | 1000 | 14       | 23     |
|        | 150g/L 賜派滅水分散性油懸劑      | 1500 | 14       | 23     |
| 葉部薊馬   | 2%阿巴汀乳劑                | 1000 | 12       | 6      |
|        | 2%阿巴汀水基乳劑              | 1000 | 12       | 6      |
| 葉部薊馬   | 9.6%益達胺溶液              | 2000 | 6        | 4A     |



| 病蟲害別       | 藥劑名稱                 | 稀釋倍數          | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|------------|----------------------|---------------|----------|--------|
| 類          | 9.6%益達胺水懸劑           | 2000          | 6        | 4A     |
|            | 2.5%賜諾殺水懸劑           | 1000          | 3        | 5      |
|            | 11.6%賜諾殺水懸劑          | 4500          | 3        | 5      |
|            | 80%賜諾殺可濕性粉劑          | 32000         | 3        | 5      |
|            | 2.9%貝他-賽扶寧乳劑         | 1500          | 9        | 3A     |
|            | 43%佈飛松乳劑             | 800           | 10       | 1B     |
|            | 25%福化利乳劑             | 3000          | 7        | 3A     |
|            | 2.5%賽洛寧微乳劑           | 2000          | 9        | 3A     |
|            | 2.46%賽洛寧膠囊懸著劑        | 2000          | 9        | 3A     |
|            | 2.8%賽洛寧水懸劑           | 2000          | 9        | 3A     |
|            | 2.8%賽洛寧乳劑            | 2000          | 9        | 3A     |
|            | 1%賽洛寧可濕性粉劑           | 700           | 9        | 3A     |
|            | 5%賽洛寧水分散性粒劑          | 3500          | 9        | 3A     |
|            | 20%覆滅蟊水溶性粉劑          | 400           | 14       | 1A     |
|            | 11.7%賜諾特水懸劑          | 8000          | 6        | 5      |
|            | 5.87%賜諾特水懸劑          | 4000          | 7        | 5      |
|            | 2.8%第滅寧乳劑            | 1500          | 6        | 3A     |
|            | 2.8%第滅寧水基乳劑          | 1500          | 6        | 3A     |
|            | 2.4%第滅寧水懸劑           | 1500          | 6        | 3A     |
| 葉蟊類        | 2.5%賽洛寧微乳劑           | 1000          | 6        | 3A     |
|            | 2.46%賽洛寧膠囊懸著劑        | 1000          | 6        | 3A     |
|            | 2.8%賽洛寧乳劑            | 1000          | 6        | 3A     |
|            | 2.8%賽洛寧水懸劑           | 2000          | 6        | 3A     |
|            | 5%芬普蟊水懸劑(避免與石灰硫磺劑混用) | 1000          | 9        | 21A    |
|            | 240g/L 賜滅芬水懸劑        | 2000          | 21       | 23     |
| 馬鈴薯園<br>雜草 | 13.5%固殺草溶液           | 3-5 公升/<br>公頃 |          | H      |

1. - : 免訂容許量



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理  
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

2. 上述資料以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治

3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.0 版 100.09.14 整理 | 1.1 版 100.10.13 整理 | 1.2 版 101.03.29 更新 | 1.3 版 103.02.21 更新 |
| 1.4 版 103.08.13 更新 | 1.5 版 105.01.15 更新 | 1.6 版 105.04.28 更新 | 1.7 版 105.08.02 更新 |
| 1.8 版 105.12.30 更新 | 1.9 版 106.01.13 更新 | 2.0 版 106.08.24 更新 |                    |