



長豇豆病蟲害防治藥劑

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白粉病	5%三泰隆可濕性粉劑	2000	3	G1
	84.2%三得芬乳劑	3500	9	G2
	10.5%平克座乳劑	4000	6	G1
	50%白克列水分散性粒劑	2500	9	C2
	24.9%待克利乳劑	3000	3	G1
	24.9%待克利水懸劑	3000	3	G1
	25%待克利乳劑	3000	3	G1
	10%待克利水分散性粒劑	1200	3	G1
	50%枯草桿菌可濕性粉劑	800	-	
	50%撲滅寧可濕性粉劑	1200	14	E3
	99%礦物油乳劑	500	-	NC
	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	1000	-	NC
幼苗疫病	25%依得利乳劑	1500	播種當日及 10 或 15 天後灌藥 1 次。	F3
	35%依得利可濕性粉劑	3000	播種當日及 10 或 15 天後灌藥 1 次。	F3
露菌病	23%亞托敏水懸劑	2000	14	C3
	25%亞托敏水懸劑	2000	14	C3
	48%松香酯銅乳劑	1000	-	16
疫病	63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
	70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	400	-	M1
	75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500	-	M1
	85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	500	-	M1
	23%亞托敏水懸劑	1000	14	C3
	25%亞托敏水懸劑	1000	14	C3
白絹病	15%福多寧乳劑	900	14	C2
	20%福多寧水懸劑	1200	14	C2
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	14	C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	14	E3
炭疽病	32.5%亞托待克利水懸劑	2000	7	C3 ; G1
	10%待克利水分散性粒劑	800	3	G1



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	24.9%待克利乳劑	3000	3	G1
	24.9%待克利水懸劑	3000	3	G1
	25%待克利乳劑	3000	3	G1
	23.6%百克敏乳劑	3000	7	C3
	40%四氯異苯腈水懸劑	300	6	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	6	M6
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	600	6	M7
銹病	38%白列克敏水分散性粒劑	1500	9	C2 ; C3
	75%嘉保信可濕性粉劑	1500	6	C2
	33%鋅錳乃浦水懸劑	400	12	M3
煤黴病	23%三泰隆水分散性乳劑	3000	3	G1
	24.9%待克利乳劑	3000	3	G1
	24.9%待克利水懸劑	3000	3	G1
	25%待克利乳劑	3000	3	G1
灰黴病	37.4%派美尼水懸劑	1500	14	D1
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	14	D1 ; E2
赤葉蟎	18.5%大克蟎可濕性粉劑	500	-	un
	35%大克蟎可濕性粉劑	950	-	un
	35%芬佈克蟎可濕性粉劑	500	7	un ; 12B
細蟎類	25%新殺蟎乳劑	500	14	un
螟蛾類	10%克凡派水懸劑	1000	18	13
	44.9%陶斯松乳劑	1000	16	1B
	40%賽速安勃水分散性粒劑	5000	6	4A ; 28
	30%賽速安勃水懸劑	4000	6	4A ; 28
夜蛾類	2.15%因滅汀乳劑	1500	3	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	3	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	3500	3	6
	43%佈飛松乳劑	1000	10	1B
	10%克凡派水懸劑	1000	18	13
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	6	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	6	28
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	44.9%陶斯松乳劑	1000	16	1B
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	3	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	3	3A



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	3	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	3	3A
	40%賽速安勃水分散性粒劑	5000	6	4A ; 28
	30%賽速安勃水懸劑	4000	6	4A ; 28
	5%賽滅寧乳劑	1500	9	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	9	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	9	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	9	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	9	3A
毒蛾類	10%克凡派水懸劑	1000	18	13
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	44.9%陶斯松乳劑	1000	16	1B
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	3	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	3	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	3	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	3	3A
	40%賽速安勃水分散性粒劑	5000	6	4A ; 28
	30%賽速安勃水懸劑	4000	6	4A ; 28
蚜蟲類	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	3	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	3	3A
豆蚜	10%福瑞松粒劑	10 公斤/公頃	種植前	1B
粉蝨類	25%派滅淨可濕性粉劑	2000	21	9B
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	9	4A
薊馬類	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	3	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	3	3A



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	7	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	7	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	3	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
花部薊馬類	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	3	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	3	3A
斑潛蠅類	8.9%賽滅淨溶液	1000	7	17
	75%賽滅淨可濕性粉劑	6000	7	17
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
根、莖潛蠅	10%福瑞松粒劑	10 公斤/公頃	種植前	1B
	8.9%賽滅淨溶液	1000	7	17

1. 上述資料更新日期為 2016 年 3 月 3 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.01.10 整理
 1.1 版 101.03.05 更新
 1.2 版 101.04.02 更新
 1.3 版 101.07.13 更新
 1.4 版 102.04.23 更新
 1.5 版 103.02.14 更新
 1.6 版 103.02.21 更新
 1.7 版 103.03.20 更新
 1.8 版 103.08.13 整理
 1.9 版 104.05.28 整理
 2.0 版 105.03.03 整理