



竹病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
竹細菌性萎凋病	85%邁隆可濕性粉劑（自產筍期前一個月開始，至收穫完畢為止，每隔 15 天施藥 1 次）	500 倍， 4 公升/ 平方公尺	-	
竹象鼻蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6 天	4A
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	50%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
竹捲葉蛾類	5.7%賽扶寧乳劑	250	9	G1
竹毒蛾類及夜蛾類	22.6%滅芬諾水懸劑	2000	28	18
竹鱗翅目害蟲	20%依芬寧可濕性粉劑	1500	14	3A
	10%依芬寧乳劑	750	14	3A
	10%諾伐隆乳膠劑	1500	21	15
	85%庫斯蘇力菌水分散性粒劑	3000	-	11A
蚜蟲類（竹葉扁蚜、竹莖扁蚜）	0.5%可尼丁粒劑	90 公斤/ 公頃	3	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	6	4A
	6%苦參鹼溶液	1500		
	9.6%益達胺水懸劑	4000	6	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	6	4A
	40%納乃得水溶性粉劑	1250	6	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1250	6	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1250	6	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	750	6	1A
	5%賽扶寧水基乳劑	2000	9	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	5.7%賽扶寧乳劑	2000	9	3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	20%達特南水溶性粒劑	2000	6	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	14	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	14	4A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	21	3A
	5%護賽寧溶液	1500	21	3A
竹盲椿象（竹蚊、青蚊） 5月蟲害發生時每10-15天施藥1次，施用2-3次（同一地區以施行共同防治效果較佳，施藥竹林不得採葉）	30%撲芬松乳劑	1500	-	1B/3A
	30%撲芬松水基乳劑	1500	-	1B/3A
	20%芬化利乳劑	2000	-	3A
	20%芬化利水基乳劑	2000	-	3A
	20%芬化利可濕生粉劑	2000	-	3A
	10%芬化利乳劑	1000	-	3A
	5%芬化利乳劑	500	-	3A

1. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。
2. 其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理--病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
3. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959

1.0版 99.09.09 整理
 1.1版 101.03.29 更新
 1.2版 103.02.21 更新
 1.3版 105.12.16 更新
 1.4版 110.02.18 更新