

輸日芒果病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會農業藥物毒物試驗所
(107.04.17 修訂)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑種類

※ 請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	免賴得	2	2		
	芬瑞莫	1.0	0.5	6	
	無水硫酸銅	—	—	6	
	◎鋅錳邁克尼	2 1.0	2 0.5	18	二硫代 [Ⓢ] 邁克尼
	◎貝芬依滅列	2 2	2 1	6	貝芬替 依滅列
炭疽病	甲基鋅乃浦	2	2	30	二硫代 [Ⓢ]
	免得爛	2	2	21	二硫代 [Ⓢ]
	鋅錳乃浦	2	2	15(SC) 30(WP)	二硫代 [Ⓢ]
	得恩地	2	2	30	二硫代 [Ⓢ]
	錳乃浦	2	2	30	二硫代 [Ⓢ]
	三氟敏	0.7	0.7	18	
	亞托敏	1	1	12	
	撲克拉錳	2 —	1 —	6	撲克拉
	依普同	10	2	12	
	甲基多保淨	2	2	6	貝芬替
	◎貝芬撲克拉	2 2	2 1	6	貝芬替 撲克拉
	◎貝芬錳	2 2	2 2	6	貝芬替 二硫代 [Ⓢ]
	◎鋅錳邁克尼	2 1.0	2 0.5	18	二硫代 [Ⓢ] 邁克尼
黑斑病	三元硫酸銅	—	—	3	
	氫氧化銅	—	—	—	
蒂腐病	枯草桿菌	—	—	—	
疫病	純白鏈黴菌素	—	—	—	
薊馬類	益達胺	1	0.5	9	
	賜諾特	0.3	0.2	12	
	賽洛寧	0.5	0.5	9	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
薊馬類	可尼丁	1	0.5	6	
	◎第滅達胺	0.5 1	0.2 0.5	6(WG) 12(SC)	
木蝨	納乃得	3	2	9	
	益達胺	1	0.5	9	
	礦物油	—	—	—	
葉蟬	加保利	3	0.5	15	
	可尼丁	1	0.5	6	
	納乃得	3	2	9	
	益達胺	1	0.5	6	
	達特南	1	1	6	
	賽洛寧	0.5	0.5	9	
	◎益洛寧	0.1 0.5	0.1 0.5	12	益滅松 賽洛寧
介殼蟲類	達特南	1	1	10	
	礦物油	—	—	—	
	賜派滅	0.3	0.3	10	
螟蛾	加保利	3	0.5	15	
	芬殺松	5	1	12	
檬果細蛾 毒蛾、夜蛾類	賜諾特	0.3	0.2	12	
	賽洛寧	0.5	0.5	9	
	◎益洛寧	0.1 0.5	0.1 0.5	12	益滅松 賽洛寧
壯鋏普癭蚧	加保利	3	0.5	15	
	芬殺松	5	1	12	
	納乃得	3	2	9	
	第滅寧	0.5	0.2	12	
	達特南	1	1	6	
東方果實蠅	芬殺松	5	1	12	
	第滅寧	0.5	0.2	12	
	賜諾殺	0.3	未訂	3	不可噴及果實
葉蟬	新殺蟎	2	2	21	
	芬普蟎	1	0.5	6	
	芬普寧	2	1	12	
	賜派芬	1	0.5	6	
	得芬瑞	0.5	0.5	6	
雜草	嘉磷塞異丙胺鹽	0.2	0.2	未訂	勿噴及作物
	固殺草	0.1	0.05	未訂	勿噴及作物

二、臺日雙方皆訂有殘留容許量，但日本標準較我國略嚴之藥劑種類（日本標準為我國 $\frac{1}{2}$ 以內者）：

※ 欲生產輸日芒果者請謹慎使用，技術問題請洽轄區農業改良場

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	◎快得保淨	0.5 2	2 2	18	快得寧 甲基多保淨
炭疽病	克熱淨（烷苯磺酸鹽）	0.3	0.5	12	
	三氟敏	0.7	0.7	18	
	◎腐絕快得寧	3 0.5	5 2	6	腐絕 快得寧
葉蟬	亞滅培	1	2	6	
	賽速安	0.2	0.2	6	
	布芬淨	0.9	1	15	
	◎布芬第滅寧	0.9 0.5	1 0.2	9	布芬淨 第滅寧
	◎布芬益化利	0.9 1.0	1 1	9	布芬淨 益化利
	◎撲芬松	0.8 1.0	1 1	6	撲滅松 芬化利
螟蛾	撲滅松	0.8	1		
	◎撲芬松	0.8 1.0	1 1	6	撲滅松 芬化利
檬果木蝨	布芬淨	0.9	1	15	
介殼蟲類	亞滅培	1	2	6	
薊馬類	克凡派	0.3	0.5	12	
	亞滅培	1	2	6	

三、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

※ 欲生產輸日芒果者，開花期後應避免使用

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	三泰芬	0.05	0.5	6	
	三泰隆	0.05	0.5	6	三泰芬代謝物
	平克座	0.05	0.5	6	
	普克利	0.05	1	6	
	四克利	*	0.5	6	
	布瑞莫	*	2		
	依瑞莫	*	2	10	
	溴克座	*	0.5	6	
	保粒黴素(甲)	*	—	7	
	◎白列克收欣	* 0.3	0.5 1	6	白克利 克收欣
	◎得克芬胺	0.1 *	1 0.1	9	得克利 賽芬胺

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
白粉病	◎賽普待克利	1 0.07	1 0.5	6	賽普洛 待克利
	◎ <u>菲克利</u> 腐絕	* 3	0.5 5	12	<u>菲克利</u> 腐絕
炭疽病	克收欣	0.3	1	6	
	滅特座	*	0.5	12	
	腈硫醃	*	0.5	6	
	百克敏	0.05	0.5	12	
	得克利	0.1	2	6	
	待克利	0.07	0.5	6	
	<u>扶吉胺</u>	*	0.5	6	
	◎嘉賜貝芬	* 2	0.5 2	6	<u>嘉賜黴素</u> 貝芬替
	◎賽普護汰寧	1 *	1 2	9	賽普洛 <u>護汰寧</u>
	◎ <u>腈硫克敏</u>	* 0.05	0.5 0.5	12	<u>腈硫醃</u> 百克敏
疫病	◎貝芬四克利	2 *	2 0.5	6	貝芬替 <u>四克利</u>
	◎貝芬菲克利	2 *	2 0.5	12	貝芬替 <u>菲克利</u>
	◎亞托待克利	1 0.07	1 0.5	21	亞托敏 待克利
	◎三氟 <u>派瑞</u>	0.7 *	0.7 0.8	18	三氟敏 <u>氟派瑞</u>
疫病	◎氟比拔克	* *	2 10	14	<u>氟比來</u> 普拔克
黑斑病	◎嘉賜快得寧	* 2	0.5 0.5	6	<u>嘉賜黴素</u> 快得寧
	◎嘉賜銅	* —	0.5 —	6	<u>嘉賜黴素</u> 鹼性氯氧化銅
	護粒丹	* *	0.5 2	6	<u>護粒松</u> <u>熱必斯</u>
	維利黴素	*	—	未訂	
	歐索林酸	*	1	12	
薊馬類	丁基加保扶	0.2	2	21	
	滅賜克	0.05	0.1	21	
	畢芬寧	0.3	1	20	
	脫芬瑞	*	1	21	
壯缺普癭蚋	丁基加保扶	0.2	2	21	

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
葉蟬	貝他-賽扶寧	0.02	0.5	6	★
	亞滅寧	0.03	2	9	★賽滅寧異構物
	護賽寧	0.05	1	15	
	免敵克	*	0.5	20	
	畢芬寧	0.3	1	20	
	派滅淨	*	0.2	9	
	速殺氟	*	0.5	14	
	◎加保福化利	3.0 *	0.5 1	6	加保利 福化利
葉蟻	扶吉胺	*	0.5	6	
抑制徒長	巴克素	0.01	0.5	未訂	限用於樹幹基部

附註：

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

⊙：二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：免得爛、鋅錳乃浦、錳乃浦、甲基鋅乃浦及得恩地等。

SC：水懸劑，WP：可濕性粉劑，WG：水分散性粒劑

★陶斯松、達馬松、賽滅寧及賽扶寧為輸日同意文件簽審不得使用藥劑。

登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

- ◆ 1.日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考 goo.gl/HM203v
- ◆ 2.我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 goo.gl/RgtB4n
- ◆ 3.我國登記使用農藥請參考防檢局農藥資訊服務網 goo.gl/cF8fR

修正版本說明：

1. 102 年日方標準「腈硫醃」由 0.5 ppm 下修為統一基準。
2. 103 年日方標準「克收欣」由 5.0 下修為 **0.3 ppm**、「賜派芬」由 2.0 下修為 1.0 ppm、「待克利」由 1.0 下修為 **0.07 ppm**。「賜諾特」由統一基準調為 0.3 ppm，「得克利」由統一基準調為 0.1ppm。
3. 104 年日方標準「賽普洛」由 5.0 下修為 1.0 ppm、「快得寧」由 2 下修為 0.5 ppm、「扶吉胺」由 0.5 下修為統一基準。
4. 106 年日方標準「菲克利」由 0.5 下修為統一基準(2017.10.10)。