



楊桃病蟲草害防治藥劑

113.03.21 更新

| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|--------------|------------------------|------|----------|--------|
| 炭疽病 | 70%甲基多保淨可溼性粉劑 | 1000 | 6 | B1 |
| | 40%甲基多保淨水懸劑 | 500 | 6 | B1 |
| | 50%三氟敏水分散粒劑 | 4000 | 18 | C3 |
| | 500g/L(50%w/v) 水分散粒劑 | 4000 | 18 | C3 |
| | 43.7%三氟敏水懸劑 | 4000 | 18 | C3 |
| | 50%克收欣水分散性粒劑 | 2000 | 6 | C3 |
| | 39.5%扶吉胺水懸劑 | 2000 | 6 | C5 |
| | 25.9%得克利水基乳劑 | 1500 | 6 | G1 |
| | 250g/L(25%w/v)得克利水基乳劑 | 1500 | 6 | G1 |
| | 53%腐絕快得寧可溼性粉劑 | 1200 | 6 | B1,M1 |
| | 500g/L(50%w/v) 三氟派瑞水懸劑 | 4000 | 7 | C3,C2 |
| | 42.2%腈硫醃水懸劑 | 1200 | 9 | M9 |
| | 22.7%腈硫醃水懸劑 | 600 | 9 | M9 |
| | 70%腈硫醃水分散性粒劑 | 2000 | 9 | M9 |
| | 70%腈硫醃可濕性粉劑 | 2000 | 9 | M9 |
| | 23.6%百克敏乳劑 | 3000 | 12 | C3 |
| | 23.6%百克敏水懸劑 | 3000 | 12 | C3 |
| | 50%亞托敏水分散性粒劑 | 4000 | 12 | C3 |
| | 23.7%依普同水懸劑 | 800 | 12 | E3 |
| | 23%亞托敏水懸劑 | 2000 | 12 | C3 |
| | 250g/L(25%w/v)亞托敏水懸劑 | 2000 | 12 | C3 |
| | 10%亞托敏水懸劑 | 800 | 12 | C3 |
| | 62.5%賽普護汰寧水分散粒劑 | 2000 | 12 | D1,E2 |
| 16%腈硫克敏水分散粒劑 | 1500 | 12 | M9,C3 | |
| 80%免得爛水分散粒劑 | 500 | 14 | M3 | |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|--------|--|---------|---------------|--------|
| | 33%鋅錳乃浦水懸劑 | 600 | 15 | M3 |
| | 65%德恩地可濕性粉劑 | 600 | 15 | M3 |
| | 80%德恩地可濕性粉劑 | 800 | 15 | M3 |
| | 40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑 | 1500 | 21 | M7 |
| | 80%鋅錳乃浦可溼性粉劑 | 400 | 30 | M3 |
| | 80%錳乃浦可溼性粉劑 | 400 | 30 | M3 |
| | 1x10 ⁹ CFU/mL 枯草桿菌 KHY8 水懸劑 | 500 | - | BM02 |
| | 1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑 | 600 | - | BM02 |
| 細菌性斑點病 | 73%鋅波爾多可濕性粉劑 | 800 | 6 | M1 |
| | 85%鹼性氫氧化銅可濕性粉劑 | 300 | 6 | M1 |
| | 68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑 | 1000 | 6 | B1,D4 |
| | 40%銅快得寧可濕性粉劑 | 500 | 6 | M1 |
| | 4-4 式 72%波爾多液可濕性粉劑 | | 6 | M1 |
| 白粉病 | 52%可濕性硫黃水懸劑 | 800 | - | un |
| | 80%可濕性硫黃水分散性粒劑 | 1200 | - | un |
| | 75%可濕性硫黃可濕性粉劑 | 1200 | - | un |
| | 80%可濕性硫黃可濕性粉劑 | 1200 | - | un |
| | 90%可濕性硫黃可濕性粉劑 | 1400 | - | un |
| | 95%可濕性硫黃可濕性粉劑 | 1400 | - | un |
| | 25%依瑞莫水懸劑 | 1500 | 14 | A2 |
| 白紋羽病 | 40%亞賜圃乳劑 | 25ml/株 | 病株更新前一星期混拌於土壤 | F2 |
| | 40%亞賜圃可濕性粉劑 | 25 公克/株 | | F2 |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|--------------|--|------------|------------|--------|
| | 39.5%扶吉胺水懸劑 | 500 | 6 | C5 |
| 灰黴病 | 1x10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑 | 600 | - | BM02 |
| 煤病 | 套袋甲 | | 果實 5 公分時施用 | |
| 葉蟎類 | 10%得芬瑞可溼性粉劑 | 2000 | 7 | 21A |
| | 1%密滅汀乳劑 | 1500 | 6 | 6 |
| | 20%賽芬蟎水懸劑 | 2000 | 7 | 25 |
| | 18.3%芬殺蟎水懸劑 | 3000 | 7 | 21A |
| | 10%芬殺蟎乳劑 | 1500 | 7 | 21A |
| | 15%芬殺蟎水懸劑 | 2500 | 7 | 21A |
| | 10%芬普寧水懸劑 | 1000 | 9 | 3A |
| | 2.8%畢芬寧乳劑 | 2000 | 9 | 3A |
| | 2.5%畢芬寧水懸劑 | 2000 | 9 | 3A |
| | 5%芬普蟎水懸劑 | 1000 | 14 | 21A |
| | 30%賜派芬水懸劑 | 2500 | 15 | 23 |
| | 240g/L(24%w/v)賜派芬水懸劑 | 2000 | 15 | 23 |
| | 46.5%愛殺松水懸劑 | 800 | 21 | 1B |
| | 46.5%愛殺松水基乳劑 | 800 | 21 | 1B |
| 蟎蟀類 | 5%芬普蟎水懸劑 | 1000 | 14 | 21A |
| 捲葉蛾類 | 2.8%第滅寧乳劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 2.4%第滅寧水懸劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 2.8%第滅寧水基乳劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑 | 1500 | 6 | 3A |
| 毒蛾類、 烏羽蛾類 | 5.87%賜諾特水懸劑 | 1000 | 12 | 5 |
| | 11.7%賜諾特水懸劑 | 2000 | 12 | 5 |
| 斜紋夜蛾 | 5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑 | 每公頃設置 7 組中 | - | - |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|-------|------------------------|-------------|----------|--------|
| | | 改式昆蟲性費洛蒙誘蟲器 | | |
| | 91.2%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑 | 5-10個/公頃 | - | - |
| 甜菜夜蛾 | 80.2 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑 | 11-18 個點/公頃 | - | - |
| | 87.2 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑 | 500 條/公頃 | - | - |
| 東方果實蠅 | 95%含毒甲基丁香油溶液 | 6 塊/公頃 | - | 1B |
| | 0.02%賜諾殺濃餌劑 | 8 | 3 | 5 |
| | 50%芬殺松乳劑 | 1000 | 9 | 1B |
| | 50%芬殺松水基乳劑 | 1000 | 9 | 1B |
| | 20%芬化利乳劑 | 2000 | 18 | 3A |
| | 20%芬化利水基乳劑 | 2000 | 18 | 3A |
| | 20%芬化利可濕性粉劑 | 2000 | 18 | 3A |
| | 10%芬化利乳劑 | 1000 | 18 | 3A |
| | 5%芬化利乳劑 | 500 | 18 | 3A |
| | 5%賽扶寧水基乳劑 | 1600 | 21 | 3A |
| 薊馬類 | 3%亞滅寧水基乳劑 | 1000 | 6 | 3A |
| | 3%亞滅寧乳劑 | 1000 | 6 | 3A |
| | 2.4 第滅寧水懸劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 2.8 第滅寧乳劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 2.8 第滅寧水基乳劑 | 1500 | 6 | 3A |
| | 42%益洛寧可溼性粉劑 | 1500 | 9 | 3A,1B |
| | 9.6%益達胺溶液 | 2000 | 9 | 4A |
| | 9.6%益達胺水懸劑 | 2000 | 9 | 4A |
| | 18.2%益達胺水懸劑 | 4000 | 9 | 4A |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|------|--------------------------|---------------------------|----------|--------|
| | 20%達特南水溶性粒劑 | 3000 | 9 | 4A |
| | 10%克凡派水懸劑 | 1500 | 12 | 13 |
| | 20%亞滅培可溶性粉劑 | 4000 | 12 | 4A |
| | 20%亞滅培水溶性粒劑 | 4000 | 12 | 4A |
| | 28.8%益達胺溶液 | 6000 | 12 | 4A |
| | 20%覆滅蟎水溶性粉劑 | 600-800 | 14 | 1A |
| | 40%加保福化利可溼粉劑 | 2000 | 14 | 1A,3A |
| | 5.87%賜諾特水懸劑 | 1600 | 14 | 23 |
| | 11.7%賜諾特水懸劑 | 3200 | 14 | 23 |
| | 100g/L(10%w/v)賜派滅水懸劑 | 1500 | 14 | 23 |
| | 150g/L(15%w/v)賜派滅水分散性油懸劑 | 2500 | 14 | 23 |
| | 25%福化利乳劑 | 3000 | 18 | 3A |
| | 240g/L(24%w/v)福化利水基乳劑 | 3000 | 18 | 3A |
| 粉介殼蟲 | 50%速殺氟水分散性粒劑 | 7500 | 7 | 4C |
| | 21.8%速殺氟水懸劑 | 3000 | 7 | 4C |
| 介殼蟲類 | 95%礦物油乳劑 | 200 | - | |
| | 97%礦物油乳劑 | 200 | - | |
| | 99%礦物油乳劑 | 200 | - | |
| | 11%百利普芬乳劑 | 1500 | 12 | 7C |
| | 11%百利普芬水基乳劑 | 1500 | 12 | 7C |
| | 11%百利普芬水基乳劑 | 1500 | 12 | 7C |
| 除草劑 | 13.5%固殺草溶液 | 3-5 公升/公頃·稀釋至600 公升 | | H |
| | 18.02%固殺草溶液 | 2.25-3.75 公升/公頃·稀釋至600 公升 | | H |



1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959