



柑橘類病蟲害防治藥劑

110.04.01 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
寄生性線蟲	3%丁基加保扶粒劑	330 公克/株	春芽萌發時	1A
	5%丁基加保扶粒劑	200 公克/株	春芽萌發時	1A
	10%托福松粒劑	50 公克/株	春芽萌發時	1B
	10%芬滅松粒劑	30 公斤/公頃	春芽萌發時	1B
	40%芬滅松乳劑	2000	新芽萌發時	1B
	10%普伏松粒劑	30 公斤/公頃	萌芽時施藥	1B
	30%滅線蟲粒劑	28 公斤/公頃	萌芽時施藥	4
	25%幾丁質粒劑	7.5 公斤/株	發芽時施藥	-
炭疽病	23%亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	250G/L(25%W/V)亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	10%亞托敏水懸劑	900	6	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	6	C3
	23.6%百克敏乳劑	3000	7	C3
	23.6%百克敏水懸劑	3000	7	C3
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	10	C5
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	21	D1,E2
80%免得爛水分散性粒劑	500	25	M3	
瘡痂病	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	-	B1
	40%甲基多保淨水懸劑	500	-	B1
	50%免賴得可溼性粉劑	3000	-	B1
	23%亞托敏水懸劑	3000	6	C3
	250G/L(25%W/V)亞托敏水懸劑	3000	6	C3
	10%亞托敏水懸劑	1200	6	C3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%亞托敏水分散性粒劑	6000	6	C3
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	10	C5
	15%易胺座可溼性粉劑	3000	6	G1
	40%快得寧可溼性粉劑	500	-	M1
	80%快得寧可溼性粉劑	1000	-	M1
	33.5%快得寧水懸劑	400	-	M1
	40%快得寧水分散性粒劑	500	-	M1
	70%腈硫醃水分散性粒劑	1000	-	M9
	70%腈硫醃可溼性粉劑	1000	-	M9
	22.7%腈硫醃水懸劑	300	-	M9
	42.2%腈硫醃水懸劑	600	-	M9
疫病	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	6	M1
	80%福賽得可溼性粉劑	200	6	P7
	76.5%銅滅達樂可溼性粉劑	1000	9	M1, A1
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	500	21	M3,A1
	58%鋅錳滅達樂可溼性粉劑	500	21	M3,A1
儲藏性病害	40%腐絕可溼性粉劑	500	果實包裝前	B1
	41.8%腐絕水懸劑	500	果實包裝前	B1
	25%克熱淨溶液	2000	採收前4天	M7
潰瘍病	5x10 ⁹ CFU/G 以上液化	600	結果後開始	-



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑		施藥	
	10%維利黴素溶液	800	-	-
	56%氧化亞銅可溼性粉劑	600	-	-
	61.4%氫氧化銅水分散性粒劑	500	-	M1
	37.5%氫氧化銅水懸劑	300	-	M1
	53.8%氫氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
	57.6%氫氧化銅水分散性粒劑	400	-	M1
	77%氫氧化銅可濕性粉劑	700	-	M1
	77%氫氧化銅水分散性粒劑	700	-	M1
	81.3%嘉賜銅可溼性粉劑	1000		D3, M1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	-	M1
	72%波爾多可溼性粉劑	500	6	M1
黑星病	16%腈硫克敏水分散性粒劑	1000	21	M9,C3
	80%免得爛水分散性粒劑	500	25	M3
	70%甲基鋅乃浦可溼性粉劑	500	40	M3
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	500	40	M3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%免賴得可溼性粉劑	3000	-	B1
	75%四氯異苯腈可溼性粉劑	500	-	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	500	-	M5
	40%四氯異苯腈水懸劑	200	-	M5
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑-水溶性袋裝	500	-	M5
	22.7%腈硫醃水懸劑	300	-	M9
	42.2%腈硫醃水懸劑	600	-	M9
	70%腈硫醃水分散性粒劑	1000	-	M9
	70%腈硫醃可溼性粉劑	1000	-	M9
黑點病(褐色蒂腐病)	41.8%腐絕水懸劑	500	果實包裝前用	B1
	40%腐絕可濕性粉劑	500	果實包裝前用	B1
	50%三氟敏水分散性粒劑	10000	金桔、金柑採收前 27 天停止施藥。其他柑桔類採收前 21 天停止施藥	C3
	50%三氟敏水分散性粒劑	10000	14	C3
	50G/L(50%W/V)三氟敏水懸劑	10000	金桔、金柑採收前27天停止施藥。其他柑桔類採收前 21 天停止	C3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
			施藥	
	50G/L(50%W/V)三氟敏水懸劑	10000	14	C3
	500G/L(50% W/V)三氟敏水懸劑	10000	金桔、金柑採收前 27 天停止施藥。其他柑桔類採收前 21 天停止施藥	C3
	500G/L(50% W/V)三氟敏水懸劑	10000	21	C3
	22.7%腈硫醃水懸劑	1000	30	M9
	42.2%腈硫醃水懸劑	2000	30	M9
	70%腈硫醃水分散性粒劑	3000	30	M9
	70%腈硫醃可濕性粉劑	3000	30	M9
	80%鋅錳乃浦可溼性粉劑	500	40	M3
	33%鋅錳乃浦水懸劑	500	40	M3
	56%貝芬硫醃可溼性粉劑	800	30	B1,M9
白紋羽病	39.5%扶吉胺水懸劑	500	10	C5
盾介殼蟲	31.6%丁基加保扶乳劑	400	21	1A
	33%納得護賽寧可溼性粉劑	1200	9	1A, 3A
	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	-	1B
	20%大滅松乳劑	450	-	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
	40%布芬淨水懸劑	1500	-	16
	20%布芬三亞蟎乳劑	1000	-	16, 19
	150G/L(15%W/V)賜派滅水分散性油懸劑	3000	7	23
	100G/L(10%W/V)賜派滅水懸劑	2000	7	23
	95%礦物油乳劑	95	-	-
	97%礦物油乳劑	95	-	-
	99%礦物油乳劑	95	-	-
軟介殼蟲	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	-	1B
	20%大滅松乳劑	450	-	1B
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
	95%礦物油乳劑	95	-	-
	97%礦物油乳劑	95	-	-
	99%礦物油乳劑	95	-	-
粉介殼蟲	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	-	1B
	20%大滅松乳劑	450	-	1B
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
	50%加福松乳劑	1200	-	1B
	21.8%速殺氟水懸劑	3000	-	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	7500	14	4C
介殼蟲類	95%礦物油乳劑	95	-	-
	97%礦物油乳劑	95	-	-



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	99%礦物油乳劑	95	-	-
	20%免扶克乳劑	800	20	-
	25%免扶克可濕性粉劑	750	20	-
	40%免扶克水懸劑	1200	20	1A
	25%丁基加保扶可溼性粉劑	750	20	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1500	20	1A
	48.34%丁基加保扶水基乳劑	1500	20	1A
	31.6%丁基加保扶乳劑	1200	20	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	1200	20	1A
	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松水基乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	800	-	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	400	-	1B
	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松水基乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	800	-	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	400	-	1B
	50%馬拉松乳劑 + 95% 礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%大滅松乳劑	450	-	1B
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
	25%硫滅松乳劑	1000	-	1B
	100G/L(10%W/V)益斯 普水懸劑	2000	21	2B
	20%亞滅培可溶性粉劑	4000	7	4A
	11%百利普芬水懸劑	1500	12	7C



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	11%百利普芬乳劑	1500	12	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1000	12	7C
	150G/L(15%W/V)賜派滅水分散性油懸劑	3000	7	23
	100G/L(10%W/V)賜派滅水懸劑	2000	7	23
木蟲、刺粉蟲	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松水基乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	800	-	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	400	-	1B
	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	20%大滅松乳劑	450	-	1B
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
	50%陶滅蟲可溼性粉劑	1000	21	1B, 1A
葉蟎類	50%馬拉松乳劑 + 95%礦物油乳劑	800 + 95	14	1B
	46.5%愛殺松乳劑 46.5%愛殺松水基乳劑	800	30	1B
	10%芬普寧乳劑	1500	10	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	750	10	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	750	10	3A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	5%合賽多乳劑	2000	9	10A
	10%合賽多可濕性粉劑	4000	20	10A
	42%克芬蟎水懸劑	3000	30	10A
	10%依殺蟎水懸劑	4000	6	10B
50%芬佈賜可濕性粉劑	2000	60	12B	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%芬佈賜水懸劑	2000	60	12B
	30%毆蟎多可溼性粉劑	1000	15	12C
	57%毆蟎多乳劑	1500	15	12C
	57%毆蟎多水基乳劑	1500	15	12C
	25%新殺蟎乳劑	500	-	12C
	25%二福隆可溼性粉劑	1500	-	15
	25%二福隆水懸劑	1500	-	15
	20%三亞蟎乳劑	1000	18	19
	15%亞醜蟎水懸劑	1500	21	20B
	20%畢達本水懸劑	3000	6	21A
	20%畢達本可溼性粉劑	3000	6	21A
	5%芬普蟎水懸劑	2000	15	21A
	18.3%芬殺蟎水分散性乳劑	3000	21	21A
	10%芬殺蟎乳劑	1500	21	21A
	15%芬殺蟎水分散性乳劑	2500	21	21A
	4%畢汰芬水懸劑	3000	25	21A
	10%得芬瑞可溼性粉劑	3000	9	21A
	30%賜派芬水懸劑	5000	金桔、金柑 12天(其它 6天)	23
	240G/L(24% W/V)賜滅芬水懸劑	2000	14	23
	20%賽芬蟎水懸劑	3000	15	25
	7.5%合賽芬普寧乳劑	1500	21	10A,3A
	45%佈賜芬蟎水懸劑	2500	15	10A,12B
	13%芬普毆蟎多水基乳劑	1000	15	21A,12C
	39.5%扶吉胺水懸劑	1500(葉蟎類)	9	29,C5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
		2000(柑桔葉蟻)	10	
	25%蟎離丹可溼性粉劑	500		UNB
	35%芬硫克乳劑	1500	20	
	95%礦物油乳劑	95(柑桔葉蟻)	-	-
		500(葉蟎類)		
	97%礦物油乳劑	95(柑桔葉蟻)	-	-
		500(葉蟎類)		
	99%礦物油乳劑	95(柑桔葉蟻)	-	-
500(葉蟎類)				
銹蟎	50%馬拉松乳劑 + 95% 礦物油乳劑	800 + 95	14	-
	20%畢達本可溼性粉劑	3000	6	21A
	20%畢達本水懸劑	3000	6	21A
	42%克芬蟎水懸劑	3000	30	10A
	95%可溼性硫磺可溼性 粉劑	100	-	M2
	80%可溼性硫磺水分散 性粒劑	85	-	M2
	80%可溼性硫磺可溼性 粉劑	85		M2
	90%可溼性硫磺可溼性 粉劑	96	-	M2
	75%可溼性硫磺水分散 性粒劑	80	-	M2
	52%可溼性硫磺水懸劑	50	-	M2
	27.5%石灰硫黃溶液	800-1200	3	-
	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	6	6



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%毆殺滅溶液	350	7	1A
	25%丁基加保扶可溼性粉劑	1000	12	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	2000	12	1A
	48.34%丁基加保扶水基乳劑	2000	12	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	1600	12	1A
	50%汰芬隆可溼性粉劑	1000	15	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1000	15	12A
	25%汰芬隆水懸劑	500	15	12A
	50%加福松乳劑	1500	15	1B
	30%福隆納乃得水懸劑	1000	20	15,1A
	5%芬普蟎水懸劑	1000	21	21A
	25%新殺蟎乳劑	1000	21	un
	50%新殺福化利乳劑	2000	21	un,3A
	50%佈嘉信乳劑	1000	30	1A
	50%芬佈賜可溼性粉劑	2000	60	12B
	50%芬佈賜水懸劑	2000	60	12B
	25%二福隆可溼性粉劑	1500	20	15
	25%二福隆水懸劑	1500	20	15
椿象類	39.5%加保利水懸劑	400	21	1A
	40%加保利水懸劑	400	21	1A
	44.1%加保利水懸劑	450	21	1A
	50%加保利可溼性粉劑	500	21	1A
	85%加保利可溼性粉劑	850	21	1A
	20%大滅松乳劑	450	-	1B
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
薊馬類	48.34%丁基加保扶乳劑	1000	21	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	48.34%丁基加保扶水基乳劑	1000	21	1A
	25%丁基加保扶可溼性粉劑	500	21	1A
	40%丁基加保扶可溼性粉劑	800	21	1A
	20%覆滅蟎水溶性粉劑	800	14	1A
	43%佈飛松乳劑	800	21	1B
	1%賽洛寧可濕性粉劑	800	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	14	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	14	3A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	14	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	21	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	21	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	21	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	21	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	21	4A
	11.7%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	10%克凡派水懸劑	1000	7	13
37%第滅達胺水懸劑	2000	30	3A,4A	
果實蠅類	50%芬殺松乳劑	1000	21	1B
	50%芬殺松水基乳劑	1000	21	1B
	50%芬殺松乳劑	200	1.使用時加蛋白質水解物一公升。	1B
	50%芬殺松水基乳劑	200		1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	100		1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號	
	50%馬拉松乳劑	200	2.防治果實蠅	1B	
	50%馬拉松水基乳劑	200	係作局部噴施於果園周圍施用，時不得直接噴施於植株上。	1B	
	50%馬拉松可濕性粉劑	200		1B	
	20%撲滅松乳劑	75		1B	
	50%撲滅松乳劑	200		1B	
	40%撲滅松可濕性粉劑	150		1B	
	95%三氯松水溶性粉劑	720		1B	
	80%三氯松水溶性粉劑	600		1B	
	5%芬化利乳劑	500		9	3A
	10%芬化利乳劑	1000	9	3A	
	20%芬化利乳劑	2000	9	3A	
	20%芬化利水基乳劑	2000	9	3A	
	20%芬化利可濕性粉劑	2000	9	3A	
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	30	3A	
	2.8%第滅寧乳劑	1500	30	3A	
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	30	3A	
		※0.02%賜諾殺餌劑(噴佈於植株下半部之葉片，每株 4 點)	8	-	5
		95%含毒甲基丁香油溶液	6 塊/公頃	-	-
鱗翅目害蟲	25%二福隆可濕性粉劑	1500	20	15	
	25%二福隆水懸劑	1500	20	15	
鳳蝶類、刺蛾類	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5	
	5.870%賜諾特水懸劑	2000	6	5	
夜蛾類、毒蛾類	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A	
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A	
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A	
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	14	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	14	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	2000	6	5
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	14	18
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3000	14	18
潛葉蛾	40%免扶克水懸劑	1200	20	1A
	25%免扶克可濕性粉劑	750	20	1A
	20%免扶克乳劑	600	20	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	-	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	-	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	-	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900		1A
	10%毆殺滅溶液	350	7	1A
	25%馬拉松可濕性粉劑	400	-	1B
	50%馬拉松乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松水基乳劑	800	-	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	800	-	1B
	20%大滅松乳劑	450	-	1B
	44%大滅松乳劑	1000	-	1B
	25%硫滅松乳劑	500	-	1B
	50%益滅松可溼性粉劑	500	-	1B
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1B
	5%護賽寧溶液	1500	9	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	10	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	10	3A
1%賽洛寧可溼性粉劑	1600	14	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.8%賽洛寧乳劑	4000	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	4000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	4000	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	4000	14	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	8000	14	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	25%芬諾克可溼性粉劑	2000	12	7B
	50%培丹可溶性粉劑	1000		14
	25%二福隆水懸劑	1500	20	15
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	20	15
	40%益滅賽寧可溼性粉劑	2500	12	1B, 3A
	25%佈飛賽滅寧乳劑	1000	21	1B, 3A
	30%福隆納乃得水懸劑	1500	20	15, 1A
葉蟬類	20%達特南水溶性粒劑	3000	14	4A
	21.8%速殺氟水懸劑	3600	14	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	8000	14	4C
蚜蟲類	100G/L(10% W/V)益斯普水懸劑	2000	21	2B

※賜諾殺餌劑僅可以誘殺器懸掛進行誘殺，不可噴及作物。

1. - 免定容許量。
2. 資料更新以主管機關公告為準。
3. 其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

4. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：
(06)5912959