# 木瓜病蟲害防治藥劑

| 防治對象 | 防治藥劑 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 作用機制代號 |
|---|---|---|---|---|
| 炭疽病 | 80%福賽快得寧可濕性粉劑 | 1200 倍 | 6 天 | 33, M1 |
| | 70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑 | 400 倍 | 9 天 | M3 |
| | 23%亞托敏水懸劑 | 2500 倍 | 9 天 | C3 |
| | 62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑 | 1500 倍 | 9 天 | D1, E2 |
| | 70%甲基多保淨可溼性粉劑 | 1000 倍 | 6 天 | B1 |
| | 23.6%百克敏乳劑 | 3000 倍 | 12 天 | C3 |
| | 40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑 | 1500 倍 | 21 天 | M7 |
| | 25.9%得克利水基乳劑 | 1500 倍 | 6 天 | G1 |
| | 80%免得爛水分散性粒劑 | 500 倍 | 21 天 | M3 |
| | 50%三氟敏水分散性粒劑 | 4000 倍 | 18 天 | C3 |
| | 325g/L 亞托待克利水懸劑 | 3000 倍 | 21 天 | C3,G1 |
| | 38 %白列克敏水分散性粒劑 | 1500 倍 | 12 天 | C2,C3 |
| 果疫病 | 81.3%嘉賜銅可濕性粉劑 | 1000 倍 | 6 天 | D3, M1 |
| 疫病 | 純白鏈黴菌素可溶性粉劑(預防性藥劑) | 800 倍 | | 25,D4 |
| | 23%亞托敏水懸劑 | 1000 倍 | 9 天 | C3 |
| | 50%達滅芬可濕性粉劑 | 3000 倍 | 9 天 | F5 |
| | 50%達滅芬水懸劑 | 3000 倍 | 9 天 | F5 |
| | 9.4%賽座滅水懸劑 | 2000 倍 | 12 天 | C4 |
| 白粉病 | 10.5%平克座乳劑 | 2000 倍 | 3 天 | G1 |
| | 40%貝芬依滅列可濕性粉劑 | 2000 倍 | 6 天 | B1, G1 |
| | 75%快得保淨可濕性粉劑 | 600 倍 | 18 天 | M1, B1 |
| | 25%蟎離丹可濕性粉劑 | 2000 倍 | | un |
| | 50%免賴得可濕性粉劑 | 3000 倍 | | B1 |
| | 40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑 | 1500 倍 | 21 天 | M7 |
| | 30%無水硫酸銅可溼性粉劑 | 1000 倍 | - | M1 |
| | 25%普克利乳劑 | 2000 倍 | 6 天 | G1 |

| 防治對象 | 防治藥劑 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 作用機制代號 |
|---|---|---|---|---|
| 白粉病 | 18.6%賽福寧乳劑 | 1000 倍 | 苗期使用 | G1 |
| | 15%得克芬胺乳劑 | 2000 倍 | 9 天 | 3,G1; U6,un11 |
| 蒂腐病 | 23.7%依普同水懸劑 | 1000 倍 | 21 天 | E3 |
| 褐斑病 | 38%白列克敏水分散性粒劑 | 1500 倍 | 12 天 | C2,C3 |
| | 62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑 | 1500 倍 | 9 天 | D1, E2 |
| | 80%福賽快得寧可濕性粉劑 | 1200 | 6 天 | 33, M1 |
| | 23.6%百克敏乳劑 | 3000 倍 | 12 天 | C3 |
| | 10.5%平克座乳劑 | 2000 倍 | 3 天 | G1 |
| 缺硼症 | 硼砂稀釋液 | 400 倍 | | |
| 赤圓介殼蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 500-1000 倍 | 3 天 | 1B |
| 軟介殼蟲類、盾介殼蟲類 | 97%礦物油乳劑<br>95%礦物油乳劑 | 200 倍 | - | NC |
| 粉介殼蟲類 | 100g/L 賜派滅水懸劑 | 1500 倍 | 10 | 23 |
| 木瓜秀粉介殼蟲 | 50%馬拉松乳劑 | 500-1000 倍 | 3 天 | 1B |
| | 99%礦物油乳劑 | 200 倍 | - | NC |
| | 20%達特南水溶性粒劑 | 2000 倍 | 15 天 | 4A |
| 粉蝨類 | 26.8%賽扶益達胺乳劑 | 5000 倍 | 6 天 | 3A,4A |
| 蚜蟲 | 18.2%益達胺溶液 | 8000 倍 | 6 天 | 4A |
| 葉蟎類 | 4%畢汰芬水懸劑 | 3000 倍 | 6 天 | 21A |
| | 42%克芬蟎水懸劑 | 4000 倍 | 15 天 | 10A |
| | 10%依殺蟎水懸劑 | 3500 倍 | 3 天 | 10B |
| | 5%合芬寧膠囊懸著劑 | 500 倍 | 6 天 | 3A |
| | 1%密滅汀乳劑 | 1500 倍 | 6 天 | 6 |

| 防治對象 | 防治藥劑 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 作用機制代號 |
|---|---|---|---|---|
| | 30%賜派芬水懸劑 | 2500 倍 | 6 天 | 23 |
| | 10%得芬瑞可濕性粉劑 | 2000 倍 | 6 天 | 21A |
| | 10%芬普寧乳劑 | 1000 倍 | 9 天 | 3A |
| | 20%賽芬蟎水懸劑 | 2000 倍 | 12 天 | 25 |
| | 18.3%芬殺蟎水懸劑 | 3000 倍 | 12 天 | 21A |
| | 10%芬殺蟎乳劑 | 1500 倍 | 12 天 | 21A |
| | 15%芬殺蟎水懸劑 | 2500 倍 | 12 天 | 21A |
| 薊馬類 | 37%第滅達胺水懸劑 | 2000 倍 | 12 | 3A,4A |
| 雜草 | 13.5%固殺草溶液 | 5 公升,稀釋至600 公升/公頃 | | |

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新日期為 2016 年 4 月 22 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.13 整理
1.1 版 100.10.03 更新
1.2 版 101.04.02 更新
1.3 版 101.12.17 更新
1.4 版 102.01.02 更新
1.5 版 103.02.21 更新
1.6 版 103.08.13 更新
1.7 版 105.03.02 更新
1.8 版 106.04.22 更新