



## 蔬菜病蟲草害防治藥劑

109.07.15 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白銹病	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M3,A1
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6 天(設施 12 天)	B5, F4
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	H5
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	H5
	500g/L達滅芬水懸劑	3000	6	H5
	10%亞托敏水懸劑	900	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	250g/L 亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	C3
80%福賽得水分散性粒劑	500	12	33	
露菌病	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	H5
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	H5
	500g/L達滅芬水懸劑	3000	6	H5
	10%亞托敏水懸劑	900	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	250g/L 亞托敏水懸劑	2000	10	C3
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
	23.6%百克敏水懸劑	3000	9	C3
葉斑病	10%保粒黴素甲可濕性粉劑	1000	—	H4
	50%依普同可濕性粉劑	1000	6	E3
	21.2%依滅列乳劑	1500	6	G1
	44.2%克收欣水懸劑	2500	10	C3
	75%四氫異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
	75%四氫異苯腈可濕性粉劑-水溶性袋裝	700	12	M5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根腐(立枯)病	2 × 10 <sup>8</sup> CFU/G 綠木黴菌 R42(其它)粉劑	與栽培介質混拌 ( 1 : 200 )再播種或以 200 倍液澆灌，擇一使用		
	50%福多寧可濕性粉劑	2000	限苗期	C2
	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	B4
	25%賓克隆水懸劑	1000	15	B4
	25%賓克隆可濕性粉劑	1000	15	B4
銹病	84.2%三得芬乳劑	2000	6	G2
金花蟲類、象鼻蟲類	25%納乃得水溶性粉劑	800	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	9	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	20%芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	10%芬化利乳劑	1500	10	3A
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
	5%芬化利乳劑	750	10	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	2000	12	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	400	12	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	12	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	12	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	12	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	12	3A
43%佈飛松乳劑	1000	12	1B	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	500 G/L (50% W/V) 佈飛松乳劑	1000	12	1B
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	50%免速達可濕性粉劑	1000	15	14
葉蟎類	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	5%賽洛寧水分散性粒劑	2000	12	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	400	12	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	12	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	12	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	12	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	1000	12	3A
鱗翅目害蟲	6%苦參鹼溶液	1000	—	un
	54%庫斯蘇力菌 ABTS-351水分散性粒劑	1500	—	11A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	4	1A
	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	6	6
	2.15%因滅汀水懸劑	1500	6	6
	19.2G/L 因滅汀乳劑	1500	6	6
	5%因滅汀乳劑	5000	6	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	10%克凡派水懸劑	1000	10	13
	20%芬化利水基乳劑	3000	10	3A
10%芬化利乳劑	1500	10	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
	5%芬化利乳劑	750	10	3A
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	—	
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	11-18 個/公頃	—	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	—	
夜蛾類	32000IU/MG 蘇力菌水分散性粒劑	1000	—	11A
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1000	—	11A
	23.7%蘇力菌可濕性粉劑	1500	—	11A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1500	—	11A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	300G/L(30%W/V)賽速安勃水懸劑	3000	6	4A, 28
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A	
2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	10%克凡派水懸劑	1000	10	13
	10%芬化利乳劑	1500	10	3A
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	5%克福隆乳劑	2000	12	15
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	12	18
	70%得芬諾可濕性粉劑	3000	12	18
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	12	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	800	12	3A
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
毒蛾類	300G/L(30%W/V)賽速安勃水懸劑	3000	6	4A, 28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
斑潛蠅類	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	6	6
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/ 公頃	9(設施 15)	4A
	43%佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
	500G/L(50%W/V)佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1500	—	un
	25%納乃得水溶性粉劑	800	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	14000	6	4C
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	6(設施 12)	4A,3A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A	





病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	9	4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	9(設施 15)	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	25%免扶克可濕性粉劑	700	12	1A
	40%免扶克水懸劑	1000	12	1A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%賽達松水基乳劑	1000	15	1B
粉蟲類	2%益達胺粒劑	60 公斤/ 公頃	播種或定 植後	4A
	21.8%速殺氟水懸劑	2400	6	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	5500	6	4C
	25%布芬淨可濕性粉劑	1500	6	16
	40%布芬淨水懸劑	2500	6	16
	50%培丹水溶性粉劑	1000	6	14
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	150G/L賜派滅水分散性油 懸劑	1500	7	23
	100G/L賜派滅水懸劑	1000	7	23
	18.2%益達胺水懸劑	3000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	9	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	9	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	9	4A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	9	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2%阿巴汀乳劑	1000	10	6
雜草	60%丁基拉草乳劑	1000		K3
	34%施得圃乳劑	750-1000		K1
	38.7%施得圃膠囊懸著劑	900-1200		K1

1. “—”：免訂容許量
2. 如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959