



玉米病蟲害防治藥劑

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
露菌病	17.5%滅達樂溶液(限拌種使用)	5 毫升/每公斤種子		A1
	17.5%滅達樂種子處理液劑(限拌種使用)	5 毫升/每公斤種子		A1
	35%滅達樂可濕性粉劑(限拌種使用)	3 公克/每公斤種子，加水 10 毫升		A1
	35%滅達樂水懸劑(限拌種使用)	3 毫升/每公斤種子，加水 10 毫升		A1
	35%滅達樂種子處理水分散性粒劑	3 公克/每公斤種子，加水 10 毫升		A1
煤紋病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400		M3
葉斑病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400		M3
玉米銹病	11.8%護汰芬水懸劑	2000	6 天	G1
	45.5%待普克利乳劑	5000	9 天	G1
	500G/L(50%W/V)待普克利乳劑	5000	9 天	G1
黑穗病	40%滅普寧水懸劑(限拌種)	1 毫升/每公斤種子		C2
玉米螟	100g/L 諾伐隆水分散性乳劑(10%W/V)	1500	10 天	15
	0.3%芬普尼粒劑(植株不得做為飼料用)	0.4 克/株 (20 公斤/公頃)	15 天	2B
	3.8%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11
	32000IU/mg 蘇力菌水分散性粒劑	3000	-	11
	0.32% 1,600IU/mg 蘇力菌粒劑	5 公斤/公頃	-	11
	2.3% 1,600IU/mg 蘇力菌粒劑	5 公斤/公頃	-	11
	16000IU/mg 蘇力菌可濕性粉劑	600	-	11



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	50%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11
	70%蘇力菌可濕性粉劑	600	-	11
	85%蘇力菌水分散性粒劑	3000	-	11
	20%依芬寧可濕性粉劑	1500	15 天	3A
	50%加保利可濕性粉劑	500		1A
	40.64%加保扶水懸劑	800		1A
	44%加保扶水懸劑	800		1A
	3%加保扶粒劑	40 公斤/公頃	30 天	1A
	5%加保利粒劑	30 公斤/公頃	15 天	1A
	5%陶斯松粒劑	0.3-0.5 克/株 (20 公斤/公頃)	54 天	1B
	3%丁基加保扶粒劑 (僅適用於飼用玉米)	0.8 克/株 (40 公斤/公頃)	64 天	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850		1A
玉米穗夜蛾	5.87%賜諾特水懸劑	1600	9 天	5
	5%護賽寧溶液	800	15 天	3A
鱗翅目 (夜蛾、螟蛾)	20%依芬寧可濕性粉劑	1500	15 天	3A
	10%依芬寧乳劑	750	15 天	3A
玉米條背土蝗	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	6 天	3A
	2.8%第滅寧乳劑	2000	6 天	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	2000	6 天	3A
	50%撲滅松乳劑	1500	6 天	1B
	85%加保利可濕性粉劑	1000	6 天	1A
蝗蟲類	44.1%加保利水懸劑	500	6 天	1A
玉米蚜蟲	24%納乃得溶液	1000		1A
	25%納乃得水溶性粉劑 *(生育初期如發生蚜蟲平均每株 100 隻時即行噴藥。每隔 10 天噴藥一次，計二至三次。)	1000		1A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期	作用機制代號
	40%納乃得水溶性粒劑 *	1700		1A
	40%納乃得水溶性粉劑 *			
	40%納乃得水溶性粉劑水溶性袋裝 *			
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	15 天	3A
玉米薊馬類	11.7%賜諾特水懸劑	3200	9 天	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	9 天	5
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	7 天	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1700	7 天	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1700	7 天	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1700	7 天	1A
	50%撲滅松乳劑	1500	6 天	1B
	20%撲滅松乳劑	600	6 天	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	1200	6 天	1B

1. - 免定容許量。
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治。
3. 「40.64%加保扶水懸劑」、「44%加保扶水懸劑」及「24%納乃得溶液」自 2017 年 1 月 1 日起禁止販賣及使用。
4. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.25 整理
 1.1 版 101.09.13 整理
 1.2 版 104.10.23 整理
 1.3 版 105.01.13 整理
 1.4 版 105.05.23 整理
 1.5 版 105.06.06 整理
 1.6 版 105.10.31 整理