



## 香蕉病蟲害防治藥劑

| 病蟲害別 | 藥劑名稱                            | 稀釋倍數                                                                                       | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 葉斑病  | 206.7g/L 凡殺護矽得乳劑                | 0.5 公升/公頃                                                                                  | 9        | C3, G1 |
|      | 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑                    | 2.8 公斤/公頃                                                                                  | -        | M3     |
|      | 33%鋅錳乃浦水懸劑                      | 3.5 公升/公頃                                                                                  | 30       | M3     |
|      | 70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑                   | 2.8 公斤/公頃                                                                                  | -        | M3     |
|      | 80%錳乃浦可濕性粉劑                     | 使用動力微粒噴霧機噴射，使用方法以香蕉用礦物油 6 公升加展著劑(出來通或乳通散)45 公撮攪拌均勻，再加本劑 2.8 公斤 (先用水調成糊狀)，最後加水稀釋至 30 公升時使用。 |          | M3     |
|      | 70%甲基多保淨可濕性粉劑                   | 用動力微粒噴霧機噴射，以香蕉用礦物油 6 公升加展著劑「來著通或乳通散」45ml 拌勻，再加本劑 0.6KG(先用水調漿糊狀)，最後加水稀釋至 30 公升              |          | B1     |
|      | 50%免賴得可濕性粉劑                     | 1.5 公斤/公頃                                                                                  |          | 14     |
|      | 75%四氯異苯腈可濕性粉劑<br>75%四氯異苯腈水分散性粒劑 | 7                                                                                          |          | M5     |
|      | 9%滅特座乳劑                         | 施藥時將藥劑加水至 30 公升，以微粒動力噴霧機將藥液噴施於心葉及其他葉片上。                                                    |          |        |
|      | 25%普克利乳劑                        | 0.4 公升/公頃                                                                                  | 6        | G1     |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱           | 稀釋倍數                                                          | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 軸腐病  | 50%免賴得可濕性粉劑    | 1.稀釋 1000 倍後將整把果手浸漬液內三分鐘。<br>2.稀釋 300 倍後，用毛刷將藥液塗擦於果軸切口處。      |          | B1     |
|      | 41.8%腐絕水懸劑     | 1000~2000 倍                                                   | -        | B1     |
|      | 90%腐絕可濕性粉劑     | 2300~4600 倍                                                   | (包裝前)    | B1     |
|      | 40%腐絕可濕性粉劑     | 1.稀釋 250 倍，使用毛刷將藥液塗擦於果軸切口部分。2.若稀釋 2000 倍，則將把果手浸漬藥劑內三分鐘        |          | B1     |
| 黑點病  | 25%普克利乳劑       | 1000 倍                                                        | 6        | G1     |
|      | 40%腐絕可濕性粉劑     | 90 公克/公頃                                                      | -        | B1     |
|      | 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑   | 2.3 公斤/公頃                                                     | -        | M3     |
| 黑星病  | 23%亞托敏水懸劑      | 0.4 公升/公頃                                                     | 3        | C3     |
|      | 125g/L 依普氟殺乳劑  | 1600                                                          | 14       |        |
|      | 22.8%芬克座水懸劑    | 0.33 公升/公頃                                                    | 6        | G1     |
|      | 42.4%白克列水懸劑    | 0.3 公升/公頃                                                     | 6        | C2     |
|      | 14.17%依普克敏濃懸乳劑 | 發病初期，藥劑加水至 30 公升/公頃，以動力微霧噴霧器噴射於新葉及其他葉片，14 天噴一次。已非初期 0.8 公升/公頃 |          | G1,C3  |



| 病蟲害別                 | 藥劑名稱                 | 稀釋倍數       | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|----------------------|----------------------|------------|----------|--------|
|                      | 23.6%百克敏乳劑           | 0.3 公升/公頃  | 3        | C3     |
|                      | 24.9%待克利乳劑           | 0.3 公升/公頃  | 6        | G1     |
|                      | 24.9%待克利水懸劑          |            |          |        |
|                      | 250G/L 待克利乳劑(25%W/V) | 0.2 公升/公頃  | 6        | G1     |
|                      | 8.8%環克座溶液            | 0.5 公升/公頃  | 15       | G1     |
|                      | 20.8%比芬諾乳劑           | 0.5 公升/公頃  | 6        | G1     |
|                      | 33%鋅錳乃浦水懸劑           | 4 公升/公頃    | 6        | M3     |
|                      | 28%比多農乳劑             | 0.42 公升/公頃 | 6        | G1     |
| 果房保護                 | 40%腐絕可濕性粉劑           | 90 公克/公頃   | -        | B1     |
|                      | 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑         | 2.3 公斤/公頃  | -        | M3     |
| 葉斑病及<br>葉黑星病<br>聯合防治 | 28%比多農乳劑             | 0.42 公升/公頃 | 6        | G1     |
|                      | 25%三泰芬可濕性粉劑          | 3 公克/株     | -        | G1     |
| 炭疽病                  | 50%三氟敏水分散粒劑          | 4000 倍     | 18       | C3     |
|                      | 70%甲基多保淨可溼性粉劑        | 1000 倍     | 6        | B1     |
|                      | 23.6%百克敏乳劑           | 3000 倍     | 12       | C3     |
|                      | 40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑   | 1500 倍     | 21       | M7     |
|                      | 80%免得爛水分散性粒劑         | 500 倍      | 21       | M3     |
|                      | 325 G/L 亞托待克利水懸劑     | 3000 倍     | 21       | C3, G1 |
|                      | 23%亞托敏水懸劑            | 2000 倍     | 12       | C3     |
|                      | 24.9%待克利乳劑           | 1500 倍     | 6        | G1     |
|                      | 24.9%待克利水懸劑          |            |          |        |
|                      | 10%待克利水分散性粒劑         | 800 倍      | 6        | G1     |
|                      | 25.9%得克利水基乳劑         | 1500 倍     | 6        | G1     |
|                      | 25%普克利乳劑             | 1000 倍     | 6        | G1     |
|                      | 62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑     | 2000 倍     | 12       | D1,E2  |



| 病蟲害別          | 藥劑名稱          | 稀釋倍數          | 安全採收期(天) | 作用機制代號 |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
|               | 40%腐絕可濕性粉劑    | 90 公克/公頃      | -        | B1     |
|               | 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑  | 2.3 公斤/公頃     | -        | M3     |
| 介殼蟲類<br>粉介殼蟲類 | 56%大利松水基乳劑    | 1200 倍        | -        | 1B     |
|               | 60%大利松乳劑      | 1200 倍        | -        | 1B     |
|               | 50%撲滅松乳劑      | 1000 倍        | -        | 1B     |
|               | 20%撲滅松乳劑      | 400 倍         | -        | 1B     |
|               | 50%芬殺松乳劑      | 1000 倍        | -        | 1B     |
|               | 85%加保利可濕性粉劑   | 850 倍         | -        | 1A     |
|               | 47.8%撲馬松乳劑    | 1000 倍        | -        | 1B     |
|               | 81.4%撲馬松乳劑    | 1600 倍        | -        | 1B     |
|               | 100G/L 賜派滅水懸劑 | 1500 倍        | 10       | 23     |
|               | 25%必克蟲乳劑      | 500 倍         | -        |        |
|               | 30%必克蟲乳劑      | 600 倍         | -        |        |
|               | 40.8%陶斯松水基乳劑  | 2000 倍        | 15       | 1B     |
|               | 40.8%陶斯松乳劑    |               |          |        |
|               | 95%礦物油乳劑      | 200 倍         | -        |        |
|               | 97%礦物油乳劑      |               |          |        |
|               | 20%達特南水溶性粒劑   | 2000          | 10       | 4A     |
| 假莖象鼻蟲         | 40%三落松乳劑      | 1600 倍(成蟲)    | -        | 1B     |
|               | 40.8%陶斯松乳劑    | 1000 倍        | 30       | 1B     |
|               | 40.8%陶斯松水基乳劑  |               |          |        |
| 球莖象鼻蟲         | 5%陶斯松粒劑       | 30 公克/株       | -        | 1B     |
|               | 10%托福松粒劑      | 30 公克/株       | 12       | 1B     |
| 假莖及球莖象鼻蟲聯合防除  | 3%加保扶粒劑       | 36 ~ 54 公斤/公頃 | -        | 1A     |
| 蚜蟲            | 37%繁米松溶液      | 1500 倍        | -        | 1B     |
|               | 35%裕必松乳劑      | 1000 倍        | -        | 1B     |
| 葉蟎類           | 10%芬普寧水懸劑     | 1000 倍        | 12       | 3A     |



| 病蟲害別 | 藥劑名稱            | 稀釋倍數      | 安全採收期(天)        | 作用機制代號 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|--------|
|      | 10%得芬瑞可濕性粉劑     | 2000 倍    | 6               | 21A    |
|      | 30%賜派芬水懸劑       | 2500 倍    | 6               | 23     |
| 花編蟲  | 85%加保利可濕性粉劑     | 1000 倍    | 15              | 1A     |
| 薊馬類  | 2.8%第滅寧乳劑       | 3000 倍    | 結果前<br>停止使<br>用 | 3A     |
|      | 2.8%第滅寧水基乳劑     |           |                 |        |
|      | 2.4%第滅寧水懸劑      |           |                 |        |
|      | 48.34%丁基加保扶乳劑   | 1200 倍    | -               | 1A     |
|      | 48.34%丁基加保扶水基乳劑 | 1200 倍    | -               | 1A     |
|      | 10%氟尼胺水分散性粒劑    | 1500 倍    | 18              | 9C     |
|      | 18.2%益達胺水懸劑     | 2000 倍    | 12              | 4A     |
|      | 9.6%益達胺水懸劑      | 1500 倍    | 6               | 4A     |
|      | 9.6%益達胺溶液       |           |                 |        |
|      | 37%第滅達胺水懸劑      | 2000      | 12              | 3A,4A  |
|      | 2.8%畢芬寧乳劑       | 1000 倍    | 9               | 3A     |
|      | 2.5%畢芬寧水懸劑      |           |                 |        |
|      | 2.46%賽洛寧膠囊懸著液   | 2000 倍    | 9               | 3A     |
|      | 2.8%賽洛寧乳劑       |           |                 |        |
|      | 2.5%賽洛寧微乳劑      |           |                 |        |
|      | 5%陶斯松粒劑         |           | -               | 1B     |
| 水銹   | 25%普克利乳劑        | 1000 倍    | 6               | G1     |
|      | 40%腐絕可濕性粉劑      | 90 公克/公頃  | -               | B1     |
|      | 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑    | 2.3 公斤/公頃 | -               | M3     |

1. 上述資料更新日期為 2016 年3月6日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 101.03.26 整理  
1.1 版 101.03.29 更新  
1.2 版 101.05.11 更新



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理  
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1.3 版 101.12.17 更新  
1.4 版 102.04.23 更新  
1.5 版 105.03.06 更新