甘藷(食用塊根)病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
白絹病	15%福多寧乳劑	900	21	7
	20%福多寧水懸劑	1200	21	7
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	21	7
白銹病	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	21	B5, F4
基腐病	5%菲克利水懸劑 *(栽培初期於地基部澆灌1次，間隔7天施用1次，共3次)	750	9	G1
	10%菲克利水懸劑 *	1500	9	G1
	10%菲克利乳劑 *	1500	9	G1
	23%菲克利水懸劑 *	3500	9	G1
	40%腐絕可濕性粉劑 *	1000	9	B1
	41.8%腐絕水懸劑 *	1000	9	B1
蝦殼天蛾	50%加保利可溼性粉劑	500		1A
	85%加保利可溼性粉劑	850		1A
潛葉蛾	20%撲滅松乳劑	400		1B
	50%撲滅松乳劑	1000	60 天,生長期使用	1B
	40%納乃得水溶性粒劑	800		1A
	25%納乃得水溶性粉劑	500		1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	800		1A
	40%納乃得水溶性粉劑	800		1A
螟蛾類	25%納乃得水溶性粉劑	500		1A
	40%納乃得水溶性粉劑	800		1A
	40%納乃得水溶性粒劑	800		1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	800		1A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
鳥羽蛾類 夜蛾類 天蛾類	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
葉蠕類	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	2.4%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2%阿巴汀乳劑	1000	3	6
象鼻蟲類	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
金花蟲類	43%佈飛松乳劑	1000	12	1B
	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	20%亞滅培水溶性粉劑	2000	6	4A
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
甘藷猿葉蟲	2.5%陶斯松粉劑	45 公斤/公頃。在作畦時，來回各犛		1B

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
		一次後，將藥劑均勻撒佈於半畦之上，再作成整畦，然後種植藷苗		
甘藷蟻象	2.5% 陶斯松粉劑	45 公斤/公頃。在作畦時，來回各犁一次後，將藥劑均勻撒佈於半畦之上，再作成整畦，然後種植藷苗		1B
	使用性費洛蒙誘殺，一分地均勻設置 4 個誘蟲器，誘蟲器間相距 15 公尺。			

1. 上述資料更新日期以主管機關公告為準。
2. 其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治或「農藥資訊服務網」--植物保護手冊。
3. 臺南區農業改良場病蟲害診斷服務專線：(06)5912959

甘藷蟻象誘蟲器 金煌塑膠公司
04-23373867

性費洛蒙 藥毒所
04-23302101*829

1.0 版 101.07.30 整理
1.1 版 103.02.21 更新
1.2 版 105.01.13 更新
1.3 版 105.12.16 更新
1.4 版 106.01.11 更新