香瓜病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露菌病	80%福賽得水分散性粒劑	500		33
	80%福賽得可濕性粉劑	500		33
	50%枯草桿菌可濕性粉劑	800	-	
	72%波爾多可濕性粉劑	400	3	M1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	3	M1
	60%銅合腐絕可濕性粉劑	500	3	M1,B1
	93%克絕波爾多可濕性粉劑	600	3	27,M1
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1000	3	M3,B3
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	6	C4
	80%免得爛水分散性粒劑	500	6	M3
	23%亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	10%亞托敏水懸劑	900	6	C3
	250 g/L (25% W/V) 亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	6	C3
	54%快得滅達樂可濕性粉劑	400	6	M1,A1
	37%銅本達樂可濕性粉劑	600	6	M1,A1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	82%銅錳乃浦可濕性粉劑	600	9	M3
	80%福賽快得寧可濕性粉劑	1500	9	33,M1
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	12	M3,A1
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	12	M3,A1
	64%甲鋅毆殺斯可濕性粉	400	12	A1

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	劑			
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	F5
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1000	12	F5,C3
	35%達滅克絕可溼性粉劑	1500	12(設施18)	F5,27
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	72%鋅錳克絕可濕性粉劑	750	12	M3,27
	80%快得寧可濕性粉劑	1500	12	M1
	39%硫酸快得寧可濕性粉劑	400	12	M1
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	500	14	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	500	14	M5
	40%四氯異苯腈水懸劑	1000	14	M5
	70%四氯賽得可濕性粉劑	800	14	M5,33
	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	2500	15	C3,27
	39.5%普拔克溶液	400	15	28
	66.5%普拔克溶液	800	15	28
	66.5%普拔克溶液	700	定植當日(浸漬穴盤苗)	28
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6(設施12)	43,28
	17.7%安美速水懸劑	4000	6(設施12)	C4,21
	60.8%氟比拔克水懸劑	2000	6(設施12)	B5,F4

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	34%鹼氯氫氧銅水懸劑	600	-	M1
	560g/L 四氯托敏水懸劑	1000	14	C11,M5
白粉病	99%礦物油乳劑	500	-	
	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	1000	-	
	125g/L(12.5%w/v) 亞 派占乳劑	2000	3	
	50%免賴得可濕性粉劑	1500		B1
	30%賽福座可濕性粉劑	3000	3	G1
	5%三泰芬可濕性粉劑	2000	3	G1
	21.2%依滅列乳劑	2000	3	G1
	13.4%邁克尼乳劑	4000	3	G1
	12%芬瑞莫可濕性粉劑	4000	3	G1
	25%布瑞莫乳劑	3000	3	A2
	11.76%芬瑞莫乳劑	10000	6	G1
	11.6%四克利水基乳劑	1500	6	G1
	10.5%平克座乳劑	2000	6	G1
	29%核胺光動素水溶性粉劑	1400	6	
	5%三泰隆可濕性粉劑	2000	6	G1
	50%賽普洛水分散性粒劑	1500	6	D1
	22.58%快諾芬水懸劑	4000	6	E1
	50%克收欣水分散性粒劑	3000	6	C3
	21.4%硫酸銅水懸劑	500	6	M1
	25%依瑞莫水懸劑	1500	7	A2
	25%蟎離丹可濕性粉劑	1000	7	unB
	50%白克列水分散性粒劑	2500	6	C2
	60%賽福保淨可濕性粉劑	1500	18	G1,B1
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	1500	6	M7
	42.37%滅芬農水懸劑	4000	6	18

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	18.4%賽福芬胺水分散性粒劑	2000	6	U6,un11;3,G1
	500 G/L (50%W/V)氟殺克敏水懸劑	5000	7	C2,7,C3,11.
蔓枯病	11.3%保粒黴素(丁)水分散性粒劑	2000	-	19,H4
	21.2%依滅列乳劑	2000	3	G1
	3%甲基多保淨軟膏劑		6	B1
	47%保粒保淨可濕性粉劑	1000	6	D2,B1
	23%亞托敏水懸劑	4000	6	C3
	38%白列克敏水分散性粒劑	1500	9	C3,C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	15	E3
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
苗立枯病	30%殺紋寧溶液	1000		A3
	45%殺紋依得利可溼性粉劑(2 公克/平方公尺或 100 毫升/株)	1500	苗期使用	A3,F3
幼苗疫病	66.5%普拔克溶液	400		28
疫病	2.5%右滅達樂粒劑 (苗期使用)	20 公斤/公頃		A1
	25%依得利乳劑	1500	6	F3
	35%依得利可濕性粉劑	2000	6	F3
	50%達滅芬可濕性粉劑	3000	6	F5
	60.8% 氟比拔克水懸劑(務必全株均勻噴濕，包含莖基部)	1000	6(設施12)	43,28
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	6	21,C4
	$1x10^7$cfu/g 蓋棘木黴菌	2000	定植前 7	

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	可濕性粉劑		天/定植當天	
黑點根腐病	50%脫克松可濕性粉劑	1000	6	F3
細菌性斑點病	40%銅快得寧可濕性粉劑	500	3	M1
炭疽病	75%甲鋅保淨可濕性粉劑	500	6	M3,B1
	70%四氯保淨可濕性粉劑	500	14	M5,B1
地下線蟲	10%毆殺滅粒劑 (限種植前使用)	20-40 kg/ha		1A
	5%毆殺滅粒劑 (移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。限種植前使用，生長期不可施用。)	40-80 kg/ha		1A
南黃薊馬	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	25%福化利乳劑	3000	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	7	3A
	43%佈飛松乳劑(小心使用)	800	10	1B
	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	2000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	2000	6	3A
薊馬類	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	3	5
	80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	3	5
	1%賽洛寧可溼性粉劑	700	7	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	7	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	7	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	7	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
銀葉粉蝨	0.5%可尼丁粒劑 (限植穴使用)	25-30 公斤/公頃		4A
	25%派滅淨可濕性粉劑	1200	6	9B
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	6	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	4000	6	4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	3000	9	4A
	11%百利普芬乳劑	1000	9	7C
	11%百利普芬水基乳劑	1,000	9	7C
	25%布芬淨可濕性粉劑	1000	15	16
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	100g/L賜派滅水懸劑	1000	7	23
	150g/L賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
番茄斑潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	7500	15	17
蚜蟲	10%氟尼胺水分散性粒劑	4000	3	9C
	50%派滅淨水分散性粒劑	4000	6	9B
	25%派滅淨可濕性粉劑	2000	6	9B

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
二點葉蟎	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
葉蟎類	15%亞醌蟎水懸劑	1500	21	20B
細蟎類	5%芬普蟎水懸劑(避免與石灰硫磺劑混用)	2000	7	21A
夜蛾類	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
	2.15%因滅汀乳劑	2000	6	6
金花蟲類	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	7	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	7	3A
	43%佈飛松乳劑(小心使用)	1000	10	1B
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
鱗翅目害蟲	40%納乃得水溶性粒劑	1500	7	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	800	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	7	1A
瓜實蠅	0.02%賜諾殺濃餌劑	(1)稀釋倍數 2 倍，1 公升/公頃。(2)植株		5

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
		開花前每隔 5 公尺吊掛傘式誘蟲器，內置浸藥棉片，每隔 7 天更換 1 次。		
	95%克蠅溶液 85%克蠅香溶液 (誘殺雄蟲)	(1)懸掛誘殺器 10-20 個/公頃，藥液 5cc/誘殺器。(2)本劑與農藥「58%乃力松乳劑」或「50%芬殺松乳劑」混合，比例克蠅:農藥=10:1。		

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.01.05 整理
1.1 版 100.11.09 更新
1.2 版 101.04.02 更新
1.3 版 101.04.16 更新
1.4 版 102.04.23 更新
1.5 版 103.02.21 更新
1.6 版 103.03.20 更新
1.7 版 103.08.13 更新
1.8 版 105.02.03 更新
1.9 版 105.04.22 更新
2.0 版 105.10.31 更新
2.1 版 106.01.11 更新