



繖形花科小葉菜類病蟲害防治藥劑 (芹菜、茴香、芫荽)

1.9 版 105.03.22 更新

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
蔬菜苗立枯病	2×10^8 cfu/g 綠木黴菌 R42(其它)粉劑	與栽培介質混拌 (1 : 200) 再播種或以 200 倍液澆灌，擇一使用		
繖形花科小葉菜類葉斑病	10%亞托敏水懸劑	900	10	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	250g/L亞托敏水懸劑	2000	10	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	C3
小葉菜類葉斑病	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
繖形花科小葉菜類莖腐病	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	B4
	25%賓克隆可濕性粉劑	1000	15	B4
芹菜葉枯病	47%氧化亞銅水懸劑	800	7	M1
芹菜黃萎病	98%邁隆粒劑	60 公克/平方公尺	限 苗 圃 使 用	N
繖形花科小葉菜類蚜蟲類	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
芹菜蚜蟲類	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	9(設施 15)	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	9	4A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	6(設施 12)	4A,3A
繖形花科小葉菜類夜蛾類	10%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	750	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	750	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	750	6	3A
芹菜夜蛾類	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
繖形花科小葉菜類潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
芹菜潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	9(設施 15)	4A
蔬菜蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1500	-	
芹菜生長調節劑	40%勃激素 A3 水溶性粒劑	8000		

1. - 免定容許量
2. 上述資料更新日期為 2016 年 3 月 22 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959