



## 不結球萵苣及半結球萵苣病蟲草害防治藥劑

113.03.28 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
根瘤線蟲	480g/L(48%w/v)氟速芬乳劑	6 公升/公頃加水至 500 公升	種植前 7 天用	
苗立枯病	50% 福多寧可濕性粉劑	2000	限苗期使用	7
	2X10 <sup>8</sup> CFU/g 綠木黴菌 R42AP	200 倍澆灌或 1:200 (w/w) 與介質混拌		BM02
立枯病	23.2% 賓克隆水懸劑	1000	15	20
	25% 賓克隆水懸劑	1,000	15	20
	25% 賓克隆可濕性粉劑	1000	15	20
幼苗疫病	39.5% 普拔克溶液	250	12(設施 18)	28
	66.5% 普拔克溶液	400	12(設施 19)	28
葉斑病	75% 四氯異苯腈可濕性粉劑	700	12	M5
	75% 四氯異苯腈水溶性袋裝可濕性粉劑	700	12	M5
	44.2% 克收欣水懸劑	2,500	10	11
	50% 依普同可濕性粉劑	1000	6	2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	21.2% 依滅列乳劑	1,500	12	3
	10% 保粒黴素甲可濕性粉 劑	1000	-	19
葉枯病	23% 三泰隆水分散性乳劑	2000	15	3
	23% 三泰隆乳劑	2000	15	3
	21.2% 依滅列乳劑	1,500	12	3
露菌病	10% 亞托敏水懸劑	800	10	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	6	11
	250g/L(25%w/v)亞托敏水 懸劑	2000	6	11
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4000	10	11
	48% 松香酯銅乳劑	1000	-	
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1500	6	43, 28
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 以上液化澱粉 芽孢桿菌 QST713 水懸劑	400	-	BM02
	39.5% 普拔克溶液	400	12	28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	66.5% 普拔克溶液	700	12	28
	18.7% 達滅克敏水分散性粒劑	1,500	9	11, 40
	50% 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50% 達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	6	40
	80% 福賽得水分散性粒劑	500	12	P07
	71.6% 銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3	M1, 4
炭疽病	27.3% 三氟得克利水懸劑	2,500	12	11, 3
	40% 四氯異苯腈水懸劑	320	7	M5
	75% 四氯異苯腈水分散性粒劑	600	7	M5
	75% 四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7	M5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	75% 四氯異苯腈水溶性袋 裝可濕性粉劑	600	7	M5
	23.6% 百克敏水懸劑	3,000	9	11
	23.6% 百克敏乳劑	3,000	9	11
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 貝萊斯芽孢桿 菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
	10% 待克利水分散性粒劑	1,200	7	3
	24.9% 待克利水懸劑	3,000	7	3
	24.9% 待克利乳劑	3,000	7	3
	250g/L(25%w/v)待克利乳 劑	3,000	7	3
菌核病	50% 大克爛可濕性粉劑	2000	7	14
	50% 免克寧水分散性粒劑	1000	12	2
	50.5% 快得依普同可濕性粉 劑	800	21	M1, 2
	50% 貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	55% 貝芬同可濕性粉劑	1000	6	1, 2
	50% 撲滅寧水懸劑	2,000	3	2
	50% 撲滅寧可濕性粉劑	2,000	3	2
疫病	2.5% 右滅達樂粒劑	20 公斤/公頃	-	4
	10% 亞托敏水懸劑	400	10	11
	23% 亞托敏水懸劑	1000	10	11
	250g/L(25%w/v)亞托敏水 懸劑	1000	10	11
	50% 亞托敏水分散性粒劑	2000	10	11
	60.8% 氟比拔克水懸劑	1000	6	43, 28
	17.5% 滅達樂溶液	5 毫升/公頃	-	4
	17.5% 滅達樂種子處理液劑	5 毫升/公頃	-	4
	35% 滅達樂水懸劑	3 公克/公頃	-	4
	35% 滅達樂可濕性粉劑	3 公克/公頃	-	4
	35% 滅達樂種子處理水分 散性粉劑	3 公克/公頃	-	4



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	18.7% 達滅克敏水分散性粒劑	1,000	9	11, 40
	50% 達滅芬水懸劑	4000	12	40
	50% 達滅芬可濕性粉劑	4000	12	40
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	4000	12	40
	525g/L(52.5%w/v)達滅脫定水懸劑	1,000	7	45, 40
	1X10 <sup>7</sup> CFU/g 蓋棘木黴菌 ICC080/012 可濕性粉劑	2,000	-	BM02
	9.4% 賽座滅水懸劑	3,000	9	21
白粉病	84.2% 三得芬乳劑	3500	6	5
	52% 可濕性硫黃水懸劑	650	-	M2
	75% 可濕性硫黃可濕性粉劑	950	-	M2
	80% 可濕性硫黃水分散性	1000	-	M2



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	粒劑			
	80% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1000	-	M2
	90% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1150	-	M2
	95% 可濕性硫黃可濕性粉劑	1200	-	M2
黑斑病	38% 白列克敏水分散性粒劑	3,000	10	11, 7
	5x10 <sup>9</sup> CFU/g 以上液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑	600	-	BM02
灰黴病	42.4% 白克列水懸劑	1,200	14	7
	50% 白克列水分散性粒劑	1,500	14	7
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	1x10 <sup>9</sup> CFU/mL 以上液化澱粉芽孢桿菌 Ba-BPD1 水懸劑	300	-	BM02
	1x10 <sup>8</sup> CFU/mL 以上液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	400	-	BM02
萎凋病	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可濕性粉劑	200	-	BM02
	1x10 <sup>9</sup> CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01(其他)液劑	200	-	BM02
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 可濕性粉劑	250	-	BM02
	1x10 <sup>9</sup> CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	250	-	BM02
白銹病	10% 亞托敏水懸劑	900	10	11
	23% 亞托敏水懸劑	2000	10	11
	250g/L(25%w/v)亞托敏水	2000	10	11





病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	懸劑			
	50% 亞托敏水分散性粒劑	4500	10	11
	50% 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50% 達滅芬可濕性粉劑	3000	6	40
	500g/L(50%w/v)達滅芬水 懸劑	3000	6	40
	80% 福賽得水分散性粒劑	500	12	P07
細菌性斑 點病	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 以上貝萊斯芽 孢桿菌 BACY 可濕性粉劑	600	-	BM02
	1x10 <sup>9</sup> CFU/g 貝萊斯芽孢桿 菌 BF 可濕性粉劑	600	-	BM02
	20% 維利黴素溶液	1,200	-	26
細菌性軟 腐病	68.8% 多保鏈黴素可濕性粉 劑	1000	12	1, 25
	12.5% 鏈黴素溶液	1000	-	25
銹病	84.2% 三得芬乳劑	3500	6	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
切根蟲	3% 加福松粒劑	50 公斤/公頃	-	1B
	5% 免扶克粒劑	30 公斤/公頃	-	1A
	0.5% 芬化利粒劑	50 公斤/公頃	-	3A
斜紋夜蛾	5.5% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散 劑	7 個/公頃	-	
	91.2% 斜紋夜蛾費洛蒙蒸散 劑	5-10 個/公頃	-	
甜菜夜蛾	80.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散 劑	設置 11-18 個點/公頃	-	
	87.2% 甜菜夜蛾費洛蒙蒸散 劑	500 條/公頃	-	
夜蛾類	58% 乃力松乳劑	1000	4	1B
	5% 可芬諾水懸劑	1000	14	18
	35% 白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	19.2g/L(1.92%w/v)因滅汀 乳劑	2,000	6	6



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	2.15% 因滅汀水基乳劑	2,000	6	6
	2.15% 因滅汀水懸劑	2,000	6	6
	2.15% 因滅汀乳劑	2,000	6	6
	5% 因滅汀乳劑	5000	6	6
	5% 因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
	10% 克凡派水懸劑	1,000	10	13
	5% 克福隆乳劑	2000	12	15
	25% 汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50% 汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50% 汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50% 汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	500g/L(50%w/v)汰芬隆水 懸劑	1500	14	12A
	10% 芬化利乳劑	1500	14	3A
	20% 芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	14	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	20% 芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5% 芬化利乳劑	2000	10	3A
	18.4% 剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35% 剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	200g/L(20%w/v)特安勃水 懸劑	10000	2	28
	40% 益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	1B, 3A
	13.5% 納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	25% 馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50% 馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	50% 馬拉松乳劑	500	4	1B
	50% 馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	19.7% 得芬諾水懸劑	2,000	12	18
	70% 得芬諾可濕性粉劑	3,000	12	18
	2.8% 畢芬寧乳劑	2000	9	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	75% 硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	2.4% 第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	6	3A
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	1500	6	3A
	1% 賽洛寧可濕性粉劑	800	9	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2,000	9	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2,000	9	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2,000	9	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2,000	9	3A
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	4,000	9	3A
	300 g/L (30% w/v)賽速安 勃水懸劑	3,000	6	4A, 28
	10% 賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5% 賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧乳劑	1500	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	5% 賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
鱗翅目害 蟲	54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 水 分散性粒劑	1,000	-	11A
	10% 克凡派水懸劑	1000	10	13
	10% 芬化利乳劑	1500	10	3A
	20% 芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利乳劑	3000	10	3A
	20% 芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
	5% 芬化利乳劑	750	10	3A
	6% 苦參鹼溶液	1000	-	
	54% 庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑	1500	-	11A
	25% 納乃得水溶性粉劑	900	35	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	35	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水	1500	35	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	溶性粉劑			
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	35	1A
	34% 硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75% 硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	4.4% 祿芬隆乳劑	1,500	7	15
	50g/L(5%w/v)祿芬隆乳劑	1,500	7	15
毒蛾類	5% 可芬諾水懸劑	1000	14	18
	10% 克凡派水懸劑	1,000	10	13
	18.4% 剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35% 剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	300g/L(30%w/v)賽速安勃 水懸劑	3,000	6	4A, 28
蚜蟲類	16% 可尼丁水溶性粒劑	4000	9	4A
	20% 免扶克乳劑	500	12	1A
	25% 免扶克可濕性粉劑	700	12	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	40% 免扶克水懸劑	1000	12	1A
	20% 亞滅培水溶性粉劑	6,000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	6,000	9	4A
	6% 苦參鹼溶液	1500	-	
	18.2% 益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8% 益達胺溶液	12000	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6% 益達胺溶液	4000	9	4A
	25% 納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水 溶性粉劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	10	14
	1% 密滅汀乳劑	1,500	6	6
	2.4% 第滅寧水懸劑	1000	6	3A





病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	21.8% 速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	50% 速殺氟水分散性粒劑	14000	6	4C
	20% 達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	10% 賽速安水溶性粒劑	2000	6	4A
	25% 賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	24.7%(w/v)賽速洛寧膠囊水 懸混劑	4000	12	4A, 3A
	50% 賽達松水基乳劑	1000	15	1B
	50% 賽達松乳劑	1000	15	1B
	31.6% 護賽寧乳劑	8500	15	3A
薊馬類	43% 佈飛松乳劑	800	10	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳 劑	800	10	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	10% 克凡派水懸劑	1,000	10	13
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4,000	6	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	4,000	6	4A
	18.2% 益達胺水懸劑	3000	6	4A
	28.8% 益達胺溶液	4500	6	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6% 益達胺溶液	1500	6	4A
	25% 納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	40% 納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性袋裝水 溶性粉劑	1500	4	1A
	40% 納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	11.7% 賜諾特水懸劑	8,000	6	5
	5.87% 賜諾特水懸劑	4,000	6	5
	11.6% 賜諾殺水懸劑	4500	6	5
	2.5% 賜諾殺水懸劑	1000	6	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	80% 賜諾殺可濕性粉劑	32000	6	5
	1% 賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2,000	9	3A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2,000	9	3A
	2.8% 賽洛寧水懸劑	2,000	9	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2,000	9	3A
	5% 賽洛寧水分散性粒劑	3,500	9	3A
	10% 賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5% 賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5% 賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
葉部薊馬 類	18.2% 益達胺水懸劑	4000	9	4A
	28.8% 益達胺溶液	6000	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	2000	9	4A
	9.6% 益達胺溶液	2000	9	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
南黃薊馬	2.4% 第滅寧水懸劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	2000	20	3A
	25 g/L (2.5% w/v)第滅寧乳 劑	2000	20	3A
粉蟲類	25% 布芬淨可濕性粉劑	1,500	6	16
	40% 布芬淨水懸劑	2,500	6	16
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4,000	9	4A
	20% 亞滅培水溶性粒劑	4,000	9	4A
	2% 阿巴汀乳劑	1,000	10	6
	18.2% 益達胺水懸劑	3,000	9	4A
	2% 益達胺粒劑	60 公斤/公頃	-	4A
	28.8% 益達胺溶液	4,500	9	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	1,500	9	4A
	9.6% 益達胺溶液	1,500	9	4A
	50% 培丹水溶性粉劑	1,000	6	14



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	2.8% 畢芬寧乳劑	1000	9	3A
	21.8% 速殺氟水懸劑	2,400	6	4C
	50% 速殺氟水分散性粒劑	5,500	6	4C
	20% 達特南水溶性粒劑	3000	7	4A
	100g/L(10%w/v)賜派滅水 懸劑	1,000	7	23
	150g/L(15%w/v)賜派滅水 分散性油懸劑	1,500	7	23
斑潛蠅類	0.5% 可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	9	4A
	43% 佈飛松乳劑	1,000	7~15	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳 劑	1,000	7~15	1B
	2% 阿巴汀乳劑	2,000	6	6
	2.4% 第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	2.8% 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	75% 賽滅淨可濕性粉劑	5,000	7	17
	8.9% 賽滅淨溶液	800	7	17
番茄斑潛 蠅	2% 阿巴汀水基乳劑	2,000	6	6
	2% 阿巴汀乳劑	2,000	6	6
瓜實蠅	95% 克蠅溶液	-	-	
	85% 克蠅香溶液	-	-	
	25% 馬拉松可濕性粉劑	400	7	1B
青椿象	20% 撲滅松乳劑	2.5 公升/公頃	10	1B
	40% 撲滅松可濕性粉劑	1.25 公斤/公頃	10	1B
	50% 撲滅松乳劑	1000	10	1B
黃守瓜	39.5% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	40% 加保利水懸劑	400-800	7	1A
	44.1% 加保利水懸劑	450-900	7	1A
	50% 加保利可濕性粉劑	500-1000	7	1A
	85% 加保利可濕性粉劑	850-1700	7	1A
葉蟎類	1% 密滅汀乳劑	1,500	6	6
雜草	60%丁基拉草乳劑	1000	播種後施用	K3



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	34%施得圃乳劑	750-1000	播種後施用	K1
	38.7%%施得圃乳劑	900-1200	播種後施用	K1

1. “—”：免訂容許量。
2. 如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治。
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959