



落花生病蟲害防治藥劑

病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根瘤線蟲	3%加保扶粒劑	60 公斤/公頃	種植同時植溝處理	1A
	10%芬滅松粒劑	15 公斤/公頃	限種植前使用	1B
	10%毆殺滅溶液	350	生長初期	1A
葉斑病	40%四氯異苯腈水懸劑	700	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	400		M5
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	400		M5
	75% 四氯異苯腈 可濕性粉劑-水溶性袋裝	400		M5
	48.9%四氯福多寧水懸劑	750	7	M5 ; C2
	47.5%鋅錳乃浦水分散性油懸劑	600	3	M3
	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	400	3	M3
	液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑	600		
褐斑病	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	400	播種後	M3
	液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑	600		
銹病	27.3%三氟得克利水懸劑	2500	7	C3 ; G1
	5%三泰芬可濕性粉劑	600	20	G1
	28%比多農乳劑	2000	7	G1
	40%四氯異苯腈水懸劑	600	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	400	7	M5
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	400	7	M5
	48.9%四氯福多寧水懸劑	750	7	M5 ; C2
	10%亞托敏水懸劑	2000	7	C3
	23%亞托敏水懸劑	1000	7	C3
	25%亞托敏水懸劑	1000	7	C3



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%亞托敏水分散性粒劑	2000	7	C3
	25.9%得克利水基乳劑	2000	7	G1
	10%菲克利乳劑	3000	7	G1
	5%菲克利水懸劑	1500	7	G1
	10%菲克利水懸劑	3000	7	G1
	23%菲克利水懸劑	7000	7	G1
	9%滅特座乳劑	1000	3	G1
	9%滅特座溶液	1000	3	G1
	75%嘉保信可濕性粉劑	1500	14	C2
	8.8%環克座溶液	3000	7	G1
	10%環克座溶液	3000	7	G1
	18%賽福寧乳劑	750		G1
冠腐病	34.5%貝芬菲克利可濕性粉劑	每公斤種子施 0.2g	限拌種使用	B1 ; G1
	50%依普同可濕性粉劑	每公斤種子施 0.5g	限拌種使用	E3
	40%腐絕可濕性粉劑	每公斤種子施 0.5g	限拌種使用	B1
	40%腐絕水懸劑	每公斤種子施 0.5ml	限拌種使用	B1
白絹病	50%大克爛可濕性粉劑	每公斤種子施 2g	限播種前拌藥使用	F3
	15%福多寧乳劑	900	21	C2
	20%福多寧水懸劑	1200	21	C2
	50%福多寧可濕性粉劑	3000	21	C2
	50%撲滅寧水懸劑	2000	限定植時使用	2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	限定植時使用	2
赤葉蟎	25%硫滅松乳劑	800	-	1B
	68.1%毆蟎多乳劑	2000	7	12C
細蟎	25%新殺蟎乳劑	500	30	un



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
葉蟬類	50%加保利可濕性粉劑	500	-	1A
	85%加保利可濕性粉劑	850		1A
	39.5%加保利水懸劑	400		1A
	40%加保利水懸劑	400		1A
	44.1%加保利水懸劑	400		1A
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	45%硫敵芬化利可濕性粉劑	1200	21	1A ; 3A
切根蟲	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/ 公頃	定植前 3 天及定 植後 3 天、10 天	3A
薊馬類	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	10%克凡派水懸劑	1000	30	13
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	21	4A
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	7	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	7	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	14	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	14	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	14	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	14	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	14	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	14	3A
	10%賜派滅水懸劑	1500	21	23
	15%賜派滅水懸劑	2500	21	23
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	9	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	9	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	28	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	28	5
80%賜諾殺可濕性粉劑	32000	28	5	
20%覆滅蟎水溶性粉劑	400	21	1A	
夜蛾類、鱗翅	9.4%六伏隆水懸劑	2000	7	15
	14.5%因得克水懸劑	2000	7	22A



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
目害蟲	15.8%因得克乳劑	2000	7	22A
	43%佈飛松乳劑	1000	10	1B
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B ; 3A
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	21	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	21	28
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	7	18
	70%得芬諾可濕性粉劑	3000	7	18
	2.5%畢芬寧水懸劑	1000	14	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	14	3A
	44.9%陶斯松乳劑	1500	21	1B
	22.6%滅芬諾水懸劑	3000	14	18
	11.7%賜諾特水懸劑	3000	9	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1500	9	5
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	10%克凡派水懸劑	1000	21	13
	10%芬化利乳劑	1500	21	3A
	20%芬化利乳劑	3000	21	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	21	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	21	3A
	5%芬化利乳劑	750	21	3A
	34%硫敵克水懸劑	1000	14	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	14	1A
	54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1000		11
	48.1%鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	1,000		11
	2.15%因滅汀水懸劑	2000	3	6
	5%賽滅寧乳劑	1500	30	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	30	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	30	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	30	3A



病蟲害別	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	30	3A
天蛾類、毒蛾類、螟蛾類	11.7%賜諾特水懸劑	3000	9	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1500	9	5
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B ; 3A

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.13 整理
 1.1 版 103.02.21 更新
 1.2 版 104.09.15 更新
 1.3 版 105.03.03 整理
 1.4 版 108.07.19 整理
 1.5 版 112.01.12 整理