



## 水稻蟲害防治藥劑 秧苗期施用藥劑

蟲害別	藥劑名稱	用量與稀釋倍數	使用方式	作用機制代號
瘤野螟	18.4%剋安勃水懸劑	3 毫升/每公斤， 稀釋 5 倍	種子處理	28
二化螟蟲	250g/L 芬普尼種子處理 用水懸劑	6 毫升/每公斤		2B
二化螟蟲	0.3%芬普尼粒劑	120 公克/每箱	插秧前 24 小時 施用	2B
	35%剋安勃水分散性粒劑	0.25 公克/每箱， 稀釋 2000 倍		28
水稻稻螟 蛉、台灣 夜盜、樹 蔭蝶、稻 苞蟲	40%賽速安勃水分散性粒 劑	1 公克/每箱， 稀釋 500 倍		4A;28
稻心蠅	40%賽速安勃水分散性粒 劑	1 公克/每箱， 稀釋 500 倍		4A;28
褐飛蟲	0.3%芬普尼粒劑	120 公克/每箱		2B
水稻飛蟲 類	0.5%可尼丁粒劑	50 公克/每公頃		4A
瘤野螟	0.3%芬普尼粒劑	120 公克/每箱		2B
	35%剋安勃水分散性粒劑	0.25 公克/每箱， 稀釋 2000 倍		28
	40%賽速安勃水分散性粒 劑	1 公克/每箱，稀 釋 500 倍		4A;28
黑尾葉蟬	3%加保扶粒劑	100 公克/每箱		1A
	3%丁基加保扶粒劑	120 公克/每箱	1A	
水稻水象 鼻蟲	0.3%芬普尼粒劑	120 公克/每箱	2B	
	3%丁基加保扶粒劑	50 公克/每箱	1A	
	2%益達胺粒劑	50 公克/每箱	4A	
	3%加保扶粒劑	50 公克/每箱	1A	
	0.5%可尼丁粒劑	50 公克/每公頃	4A	



## 本田期施用藥劑

蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
二化螟蟲	9%培丹粒劑	* 50 公斤/公頃	21 天	14
	8%亞素靈粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	1B
	0.3%芬普尼粒劑	* 40 公斤/公頃		2B
	◎5%布芬大利松粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	16;1B
	◎10%撲殺培丹粒劑	* 60 公斤/公頃	20 天	P,P2; 14
	6%培丹粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	14
	50%撲滅松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	20%撲滅松乳劑	100 倍	21 天	1B
	50%芬殺松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	50%賽達松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	50%加福松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	5%拜裕松粒劑	* 40 公斤/公頃	21 天	1B
	3%加保扶粒劑	* 40~50 公斤/公頃	21 天	1A
	50%培丹水溶性粉劑	1000 倍	35 天	14
	4%培丹粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	14
	22.5%陶斯松乳劑	450 倍	21 天	1B
	5%大利松粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	1B
	50%益滅松可濕性粉劑	1000 倍	21 天	1B
	50%益芬松可濕性粉劑	1000 倍	21 天	
	◎6.5%滅蟲丹粒劑	* 50 公斤/公頃	40 天	14; 1A
40.64%加保扶水懸劑	1200 倍	21 天	1A	
一點螟蟲	50%撲滅松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	20%撲滅松乳劑	400 倍	14 天	1B
	50%芬殺松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	50%益滅松可濕性粉劑	1000 倍	21 天	1B
	0.3%芬普尼粒劑	* 40 公斤/公頃		2B
	6%培丹粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	14
	5%拜裕松粒劑	40 公斤/公頃	21 天	1B
	3%加保扶粒劑	40~50 公斤/公頃	21 天	1A



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
		噸		
	4%培丹粒劑	* 60 公斤/公頃	21 天	14
水稻大螟	0.3%芬普尼粒劑	20 公斤/公頃		2B
	6%培丹粒劑	30 公斤/公頃	21 天	14
	5%拜裕松粒劑	40 公斤/公頃	21 天	1B
水稻大螟	3%加保扶粒劑	40~50 公斤/公頃	21 天	1A
	4%培丹粒劑	30 公斤/公頃	21 天	14
水稻稻螟 蛉、台灣 夜盜、樹 蔭蝶	6%培丹粒劑	20 公斤/公頃	7 天	14
	2.9%貝他賽扶寧乳劑	1500 倍	7 天	3A
	1%第滅寧乳劑	750 倍	15 天	3A
	22.5%陶斯松乳劑	750 倍		1B
	50%芬殺松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	20%撲滅松乳劑	400 倍	21 天	1B
	50%撲滅松乳劑	1000 倍	21 天	1B
水稻稻苞 蟲	50%芬殺松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	6%培丹粒劑	20 公斤/公頃	7 天	14
褐飛蟲	10% 氟尼胺水分散性粒劑	0.6 公斤/公頃，稀釋 2000 倍	28 天	9C
	20%達特南水溶性粒劑	3000 倍	14 天	4A
	10%賽速安水溶性粒劑	4000 倍	10 天	4A
	19%矽護芬水基乳劑	2000 倍	14 天	3A
	25%派滅淨可濕性粉劑	1500 倍	10 天	9B
	◎5%布芬大利松粒劑	30 公斤/公頃	15 天	16; 1B
	9.6%益達胺溶液	3000 倍	10 天	4A
	9.6%益達胺水懸劑	3000 倍	10 天	4A
◎30%陶毆松乳劑	1000 倍	7 天	1B	



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
	10%依芬寧乳劑	750 倍	15 天	3A
	◎25%布芬治蟲可濕性粉劑	750 倍	15 天	16;1A
	◎25%布芬大利松可濕性粉劑	750 倍	20 天	16; 1B
	◎25%布芬滅蟲可濕性粉劑	750 倍	15 天	16; 1A
	20%蟲必殺乳劑	800 倍		
	22.5%陶斯松乳劑	750 倍		1B
	25%必克蟲乳劑	1000 倍		
	20%滅必蟲乳劑	800 倍	15 天	1A
	◎40%雙滅必蟲乳劑	800 倍		C1
	30%治滅蟲乳劑	800 倍		1A
	40%丁基滅必蟲可濕性粉劑	800 倍	15 天	1A
	50%治滅蟲可濕性粉劑	2000 倍		1A
	50%毆殺松可濕性粉劑	1000 倍	10 天	1B
	褐飛蟲	50%蟲必殺可濕性粉劑	2000 倍	
50%滅爾蟲可濕性粉劑		2000 倍		1A
50%安丹可濕性粉劑		1000 倍		1A
50%滅必蟲可濕性粉劑		1000 倍	15 天	1A
40%納乃得水溶性粉劑		800 倍		1A
40%納乃得水溶性粒劑		800 倍		1A
25%納乃得水溶性粉劑		500 倍		1A
◎50%治滅寧可濕性粉劑		1000 倍		1A; 3A
85%加保利可濕性粉劑		420 倍	21 天	1A
◎4%芬保扶粒劑		50 公斤/公頃	20 天	1A;1B
40.64%加保扶水懸劑		800 倍		1A
3%加保扶粒劑		40~60 公斤/公頃		1A



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
	30%丁基加保扶可濕性粉劑	800 倍	22 天	1A
	48.34%丁基加保扶乳劑	1000 倍	10 天	1A
	5%安丹粒劑	36 公斤/公頃		1A
	75%毆殺松水溶性粉劑	1500 倍	10 天	1B
	25%毆殺松乳劑	500 倍	10 天	1B
	8%滅必蝨粒劑	20 公斤/公頃	20 天	1A
	50%滅必蝨可濕性粉劑	1000 倍	15 天	1A
	3%必克蝨粒劑	35 公斤/公頃	15 天	
	◎40%加護丁滅蝨乳劑	800 倍	20 天	1A
	33%酚丁滅蝨乳劑	800 倍	20 天	
	50%滅克蝨可濕性粉劑	1000 倍	20 天	1A
	◎50%益丁滅蝨乳劑	1000 倍	15 天	1A; 1B
褐飛蝨	◎60%繁米蝨乳劑	1500 倍	15 天	1A; 1B
	◎4%雙必蝨粉劑	40 公斤/公頃	20 天	1A
	50%丁基滅必蝨乳劑	1000 倍	15 天	1A
	40%免敵克可濕性粉劑	1000 倍	15 天	1A
	25%布芬淨可濕性粉劑	1500 倍	15 天	16
	20%免扶克乳劑	500 倍	37 天	1A
	◎11.78%布芬第滅寧乳劑	1000 倍	15 天	16;3A
	◎11.78%布芬第滅寧水懸劑	1000 倍	15 天	16; 3A
黑尾葉蟬 (黑尾浮塵子)	20%蝨必殺乳劑	800 倍		
	22.5%陶斯松乳劑	750 倍		1B
	25%必克蝨乳劑	1000 倍		
	24%納乃得溶液	500 倍		1A
	30%治滅蝨乳劑	800 倍		1A
	40%丁基滅必蝨可濕性粉劑	800 倍	15 天	1A



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
	50%治滅蝨可濕性粉劑	2000 倍		1A
	50%毆殺松可濕性粉劑	1000 倍	10 天	1B
	50%蝨必殺可濕性粉劑	2000 倍		
	50%滅爾蝨可濕性粉劑	2000 倍		1A
	40%納乃得水溶性粉劑	800 倍		1A
	40%納乃得水溶性粒劑	800 倍		1A
	25%納乃得水溶性粉劑	500 倍		1A
	◎50%治滅寧可濕性粉劑	1000 倍		1A;3A
	85%加保利可濕性粉劑	420 倍	21 天	1A
	40.64%加保扶水懸劑	800 倍		1A
	75%毆殺松水溶性粉劑	1500 倍	10 天	1B
	50%滅必蝨可濕性粉劑	1000 倍	15 天	1A
	10%大利松乳劑	18 公斤/公頃		1B
	37%繁米松溶液	800 倍		1B
	10%百滅寧可濕性粉劑	2000 倍	15 天	3
	10%百滅寧乳劑	2000 倍	15 天	3
	20%芬化利乳劑	3000 倍		3A
	黑椿象	50%加保利可濕性粉劑	500 倍	21 天
85%加保利可濕性粉劑		850 倍	21 天	1A
斑飛蝨	9.6%益達胺溶液	1600 倍	10 天	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1600 倍	10 天	4A
	◎25%布芬大利松可濕性粉劑	750 倍	15 天	16; 1B
	◎11.78%布芬第滅寧乳劑	1000 倍	15 天	16; 3A
	◎11.78%布芬第滅寧水懸劑	1000 倍	15 天	16; 3A
	◎25%布芬治蝨可濕性粉劑	750 倍	15 天	16; 1A
	◎25%布芬滅蝨可濕性粉	750 倍	14 天	16; 1A



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
	劑			
	40.64%加保扶水懸劑	800 倍	15 天	1A
	3%加保扶粒劑	40~50 公斤/公頃		1A
	25%布芬淨可濕性粉劑	1500 倍	15 天	16
	31.6%護賽寧乳劑	6000 倍	20 天	3A
	40%布芬淨水懸劑	2000 倍	15 天	16
電光葉蟬 (電光浮塵子)	75%毆殺松水溶性粉劑	1000 倍	10 天	1B
	40.64%加保扶水懸劑	800 倍	15 天	1A
白背飛蟲	40.64%加保扶水懸劑	800 倍	15 天	1A
水稻飛蟲類	16%可尼丁水溶性粒劑	3000 倍	10 天	4A
	0.5%可尼丁粒劑	40-60 公斤/公頃		4A
	◎15%布得芬諾可濕性粉劑	1000 倍	15 天	16; 18
	25%賽速安水溶性粒劑	1600 倍	10 天	4A
水稻葉蟬類	25%賽速安水溶性粒劑	1600 倍	10 天	4A
瘤野螟 (稻縱捲葉蟲)	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	3000 倍	21 天	4A; 3A
	19%矽護芬水基乳劑	2000 倍	14 天	3A
	◎15%布得芬諾可濕性粉劑	1000 倍	15 天	16; 18
	6%培丹粒劑	20 公斤/公頃	7 天	14
	2.9%貝他賽扶寧乳劑	1500 倍	7 天	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000 倍	15 天	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000 倍	15 天	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000 倍	15 天	3A



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
	1%第滅寧乳劑	750 倍	15 天	3A
	◎30%陶殿松乳劑	600 倍	7 天	1B
	◎40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500 倍	15 天	1B; 3A
	◎11.78%布芬第滅寧乳劑	600 倍	15 天	16; 3A
	◎11.78%布芬第滅寧水懸劑	600 倍	15 天	16; 3A
	50%毆殺松可濕性粉劑	1000 倍	10 天	1B
	75%毆殺松水溶性粉劑	1500 倍	10 天	1B
	22.5%陶斯松乳劑	750 倍		1B
	40.64%加保扶水懸劑	800 倍		1A
	50%培丹水溶性粉劑	1200 倍	35 天	14
	◎6.5%滅蟲丹粒劑	* 45 公斤/公頃	10 天	14; 1A
水稻瘤野螟 (縱捲葉蟲) 及白葉枯病聯合防治	◎10%撲殺培丹粒劑	30 公斤/公頃	10 天	P2;14
水稻螟蛾類	◎15%布得芬諾可濕性粉劑	1000 倍	15 天	16; 18
稻象鼻蟲	5%免扶克粒劑	40 公斤/公頃		1A
	6%培丹粒劑	30 公斤/公頃	21 天	14
	3%加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A
	3%丁基加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A
稻鐵甲蟲	50%芬殺松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	5%免扶克粒劑	40 公斤/公頃		1A
	6%培丹粒劑	30 公斤/公頃	21 天	14
	3%加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A
	3%丁基加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
稻心蠅	37.5%加保扶可濕性粉劑	700 倍	30 天	1A
	22.5%陶斯松乳劑	750 倍		1B
	40.64%加保扶水懸劑	1500 倍		1A
	3%加保扶粒劑	30 公斤/公頃	15 天	1A
	50%芬殺松乳劑		10 天	1B
	◎4%芬保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A;1B
	◎4%益保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A;1B
	6%培丹粒劑	20 公斤/公頃	7 天	14
稻苞蟲	6%培丹粒劑	20 公斤/公頃	7 天	14
負泥蟲	3%加保扶粒劑	40~60 公斤/公頃		1A
	50%益滅松可濕性粉劑	1000 倍	21 天	1B
	40.64%加保扶水懸劑	800 倍		1A
	40%納乃得水溶性粉劑	800 倍		1A
	40%納乃得水溶性粒劑	800 倍		1A
	25%納乃得水溶性粉劑	500 倍		1A
	50%撲滅松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	50%芬殺松乳劑	1000 倍	21 天	1B
	◎50%益滅蟲可濕性粉劑	1000 倍		1A;1B
	40%丁基加保扶可濕性粉劑	1000 倍		1A
	◎4%芬保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A;1B
	◎4%益保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A; 1B
	5%免扶克粒劑	40 公斤/公頃		1A
	6%培丹粒劑	30 公斤/公頃	21 天	14
	3%丁基加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A
92%賽達松超低容量液劑	1 公斤/公頃		1B	
水稻水象	9%培丹粒劑	20 公斤/公頃	21 天	14



蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數/每公頃施用量	安全採收期	作用機制代號
鼻蟲	5%免扶克粒劑	40 公斤/公頃		1A
	6%培丹粒劑	30 公斤/公頃	21 天	1A
	3%加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A
	3%丁基加保扶粒劑	60 公斤/公頃		1A
水稻稻蟲類、葉蟬類、椿象類、薊馬類	30%治滅蝨乳劑	800 倍		1A
	50%治滅蝨可濕性粉劑	2000 倍		1A
	85%加保利可濕性粉劑	1700 倍	21 天	1A
	3%加保扶粒劑	40~60 公斤/公頃		1A
	5%丁基加保扶粒劑	40 公斤/公頃	29 天	1A
	37%繁米松溶液	1.2~1.5 公升/公頃		1B
	40%免敵克可濕性粉劑	1000 倍	15 天	1A
	20%免扶克乳劑	500 倍	37 天	1A

1. ◎混合藥劑
2. \* 分 2 次使用，每次施藥量為每公頃建議量的一半，分別於本田初期至孕穗期及孕穗至齊穗期使用。
3. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
4. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.0 版 100.04.11 整理  
 1.1 版 100.10.19 更新  
 1.2 版 101.07.30 更新  
 1.3 版 101.12.17 更新  
 1.4 版 102.04.23 更新  
 1.5 版 103.01.07 更新  
 1.6 版 103.03.20 更新  
 1.7 版 103.04.15 更新  
 1.8 版 104.12.17 更新  
 1.9 版 105.05.06 更新  
 2.0 版 105.08.11 更新