



蘿葡病蟲害防治藥劑

1.0 版 100.04.25 整理

1.1 版 100.05.02 整理

1.2 版 105.01.01 整理

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 參考	作用機制 代號
露菌病	9.4%賽座滅水懸劑	3,000	15 天	C4
	44%四氯右滅達樂水懸劑	600	21 天	M5, A1
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	12	F5
	50%達滅芬水懸劑	3000	12	F5
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	12	F5
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1,500	9 天	F5, C3
	48%快得克絕可濕性粉劑	750	15 天	M1, 27
	23%亞托敏水懸劑	2,000	15 天	C3
	53%鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	21 天	M3, A1
	58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑	400	21 天	M3, A1
	71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑	600	3 天	M1, A1
	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	7 天	M3
	48%松香酯銅乳劑	1,000	—	M1
	72%鋅錳克絕可濕性粉劑	750	21 天	M3, 27
	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	21	M3,22
苗立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1,000	15 天	B4
	2x10 ⁸ cfu/g 綠木黴菌 R42 微粒劑	與栽培介質混拌 (1:200 (w/w)) 再播種或以 200 倍稀釋液澆灌，2 種方法擇一使用。		
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3,000	9 天	C3
黑斑病	10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑	1,000	—	H4
	21.2%依滅列乳劑	1,500	12 天	G1
	75%四氯異苯腈可濕性粉劑	700	21 天	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	700	21 天	M5
細菌性軟腐病	68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑	1,000	12 天	B1, 25
	12.5%鏈黴素溶液	1,000	-	25
白銹病	75%鋅錳座賽胺水分散性粒劑	1200	21	M3,B3
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	12	F5
	50%達滅芬水懸劑	3000	12	F5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	3000	12	F5
菌核病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	14天	E3
灰黴病	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	14天	E3
斜紋夜盜蟲	37.5%汰芬諾克水分散性粒劑	1,000	14天	12A, 7B
	25%汰芬隆水懸劑	750	14天	12A
	91.2%斜紋夜蛾費洛蒙控制釋放劑		—	
	33%佈飛百滅寧乳劑	1,000	12天	1B, 3A
	30%佈飛賽滅寧乳劑	1,000	10天	1B, 3A
	35%白克松可濕性粉劑	3,000	15天	1B
	2.8%畢芬寧乳劑	2,000	9天	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2,000	9天	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	9天	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2,000	9天	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9天	3A
	58%乃力松乳劑	1,000	4天	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4天	1B
	20%芬化利水基乳劑	3,000	14天	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	14天	3A
	20%芬化利片劑	5,000	7天	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10天	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	10天	3A
	40.64%加保扶水懸劑	1,200		1A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3,000		3A
	10%百滅寧乳劑	3,000		3A
25%二福隆可濕性粉劑	1,500	23天	15	
切根蟲 (球莖夜蛾、蕪菁夜蛾)	2%依殺松粒劑	40公斤/公頃	定植前	1B
	3%加福松微粒劑	50公斤/公頃	定植前	1B
	5%免扶克粒劑	30公斤/公頃	28天	1A
	22.5%陶斯松乳劑	700	10天	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
	40.8%陶斯松乳劑	1,000	10 天	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1,000	10 天	1B
	40.64%加保扶水懸劑	1,200	15 天	1A
	3%加保扶粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1A
	3%安殺番粉劑	40-50 公斤/公頃	14 天	2A
	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	定植前	3A
	2%加福松粉劑	40 公斤/公頃	10 天	1B
	5%陶斯松粒劑	30 公斤/公頃	10 天	1B
	10%托福松粒劑	10 公斤/公頃	播種前	1B
	45%普伏松乳劑	300	定植前	1B
	3%丁基加保扶粒劑	40 公斤/公頃	定植前	1A
	25%陶斯寧乳劑	1,000	定植前	1B, 3A
小菜蛾	60%庫斯蘇力菌 E-911(30,000 DBMU/mg)可濕性粉劑	1,000	—	
	20%氟大滅水分散性粒劑	3,000	18 天	28
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3,000	12 天	4A, 28
	18.4%剋安勃水懸劑	3,000	12 天	28
	80%賜諾殺可濕性粉劑	7,500	10 天	5
	15%脫芬瑞乳劑	2,000	21 天	21A
	15%脫芬瑞水懸劑	2,000	18 天	21A
	22%美氟綜水懸劑	1,000	18 天	22B
	10%蘇力菌水分散性粒劑	1,000	—	11
	15%蘇力菌水分散性粒劑	1,500	—	11
	21.5%因滅汀乳劑	2,000	18 天	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5,000	9 天	6
11.6%賜諾殺水懸劑	3,000	6 天	5	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 參考	作用機制 代號
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6天	5
	44.2%賜諾殺水懸劑	10,000	10天	5
	1%蘇力菌水懸劑	1,000	—	11
	10.4%蘇力菌水懸劑	700	—	11
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	4,000	—	11
	3.8%蘇力菌可濕性粉劑	1,000	—	11
	蘇力菌 16000IU/mg 可濕性粉劑	1,000	—	11
	蘇力菌 32000IU/mg 水分散性粒劑	3,000	—	11
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,000	—	11
	4.5%印棟素乳劑	1,000	—	
	10%克凡派水懸劑	1,000	14天	13
	50%免速達可濕性粉劑	1,000	6天	14
	25%免速達乳劑	500	10天	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	6天	12A
	2%阿巴汀乳劑	2,000	15天	6
	5%克福隆乳劑	2,000	6天	15
	15%得福化利乳劑	2,000	15天	15, 3A
	5%得福隆乳劑	2,000	9天	15
	13.57%得福隆水懸劑	4,000	12天	15
	56%大力松水基乳劑	1,500	14天	1B
	60%大力松乳劑	1,500	14天	1B
	58%乃力松乳劑	1,000	4天	1B
	50%賽速松乳劑	1,000	15天	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10天	1B
	50%氟乃松乳劑	1,000	10天	1B
	26.3%亞特松乳劑	500	10天	1B
	43%佈飛松乳劑	1,000	12天	1B
	50%普硫松乳劑	1,500	24天	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	10天	14
	20%免扶克乳劑	500	12天	1A
	40%必芬松乳劑	800	21天	1B



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
	10%芬化利乳劑	3,000	10 天	3A
	20%芬化利水基乳劑	4,000	10 天	3A
	20%芬化利乳劑	4,000	14 天	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10 天	3A
	20%芬化利片劑	5,000	7 天	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	7 天	3A
	10%百滅寧可濕性粉劑	2,000-3,000 0	4 天	3A
	10%百滅寧乳劑	2,000-3,000 0	4 天	3A
	40.64%加保扶水懸劑	1,200	15 天	1A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1,500	6 天	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1,500	6 天	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1,500	6 天	3A
	5%賽滅寧乳劑	1,500	6 天	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6 天	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1,000	6 天	3A
	90%硫賜安水溶性粉劑	2,000	9 天	14
	25%陶斯寧乳劑	1,000	6 天	1B, 3A
	10%芬普寧乳劑	4,000	9 天	3A
	31.6%護賽寧乳劑	8,500	15 天	3A
	25%歐殺松乳劑	800	10 天	1B
75%歐殺松水溶性粉劑	1,500	14 天	1B	
45%賽滅松乳劑	1,000	10 天	1B	
擬尺蠖	58%乃力松乳劑	1,000	4 天	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10 天	1B
	26.3%亞特松乳劑	500	10 天	1B
	20%芬化利水基乳劑	3,000	14 天	3A
	20%芬化利乳劑	3,000	14 天	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	7 天	3A
	20%芬化利片劑	5,000	7 天	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	10 天	3A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	—	11



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
	40.64%加保扶水懸劑	1,200	15 天	1A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3,000	2~4 天	3A
	10%百滅寧乳劑	3,000	2~4 天	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1,500	6 天	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1,500	6 天	3A
	5%賽滅寧乳劑	1,500	6 天	3A
	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7 天	1A
	85%加保利可濕性粉劑	1,700	7 天	1A
菜心 螟、大菜 螟	58%乃力松乳劑	1,000	4 天	1B
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	—	11
	60% (30,000 DBMU/mg) 庫斯蘇力菌 E-911 可溼性粉劑	1000	—	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12 天	4A, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18 天	28
紋白蝶	4.4%祿芬隆乳劑	1,500	18 天	15
	18.1%傑他賽滅寧乳劑	5,000	10 天	3A
	2.15%因滅汀乳劑	2,000	6 天	6
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3,000	14 天	3A
	50%陶斯松可濕性粉劑	1,000	12 天	1B
	50%免速達可濕性粉劑	1,500	6 天	14
	50%加福松乳劑	1,500	20 天	1B
	1%第滅寧乳劑	1,500	6 天	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2,000	6 天	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	6 天	3A
	2.5%益化利乳劑	2,000	6 天	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	2,000	9 天	3A
	2.5%畢芬寧水懸劑	2,000	9 天	3A
	1%第滅寧乳劑	1,500	6 天	3A
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2,500	9 天	1B, 3A
	5%得福隆乳劑	2,000	9 天	15
25%陶斯松可濕性粉劑	1000	10 天	1B	
45%賽滅松乳劑	1,000	10 天	1B	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	—	11
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1,500	6天	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1,500	6天	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1,500	6天	3A
	5%賽滅寧乳劑	1,500	6天	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5,000	10天	3A
	20%芬化利片劑	5,000	7天	3A
	20%芬化利水基乳劑	4,000	14天	3A
	20%芬化利乳劑	4,000	14天	3A
	5%芬化利乳劑	2,000	10天	3A
	40.64%加保扶水懸劑	1,200	15天	1A
	10%百滅寧可濕性粉劑	3,000	2~4天	3A
	10%百滅寧乳劑	3,000	2~4天	3A
	50%硫賜安可濕性粉劑	1,500	10天	14
	75%歐殺松水溶性粉劑	1,500	14天	1B
	25%拜裕松乳劑	500	10天	1B
	4.5%印棟素乳劑	1,000	—	
	2.15%因滅汀乳劑	2,000	18天	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5,000	9天	6
	25%免速達乳劑	500	10天	14
	50%免速達可濕性粉劑	1,000	6天	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14天	15
	5%芬化利乳劑	2,000	10天	3A
	10%芬化利乳劑	3,000	10天	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6天	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	3,000	6天	5
	35%白克松可濕性粉劑	3,000	15天	1B
	60% (30,000 DBMU/mg) 庫斯 蘇力菌 E-911 可溼性粉劑	1000	—	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12天	4A, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18天	28
蚜蟲類	16%可尼丁水溶性粒劑	4,000	15天	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期 參考	作用機制 代號
	25%賽速安水溶性粒劑	5,000	12 天	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2,000	6 天	4A
	1%密滅汀乳劑	1,500	6 天	6
	20%亞滅培水溶性粉劑	6,000	12 天	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8,000	9 天	4A
	10.5%賽洛比加普乳劑	1,000	9 天	3A, 1A
	3.75%泰滅寧乳劑	1,500	6 天	3A
	5%賽扶寧水基乳劑	2,000	21 天	3A
	5.7%賽扶寧乳劑	2,000	21 天	3A
	58%乃力松乳劑	1,000	4 天	1B
	50%馬拉松乳劑	1,500	4 天	1B
	3.5%魚藤精乳劑	500	4 天	21B
	50%賽達松乳劑	1,000	15 天	1B
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	10 天	14
	50%比加普可濕性粉劑	2,000	10 天	1A
	40.64%加保扶水懸劑	1,200	15 天	1A
	20%免扶克乳劑	500	12 天	1A
	3%加保扶粒劑	40 公斤/公頃		1A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6 天	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1,000	6 天	3A
31.6%護賽寧乳劑	8,500	15 天	3A	
6%苦參鹼溶液	1500	—		
黃條葉蚤	20%達特南水溶性粒劑	3,000	3 天	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2,000	6 天	4A
	50%馬拉松乳劑	600	4 天	1B
	43%佈飛松乳劑	1,000	10 天	1B
	2%阿巴汀乳劑	2,000	15 天	6
	50%培丹水溶性粉劑	1,000	10 天	14
	6%培丹粒劑	30-40 公斤/公頃	30 天	14
	10%歐殺滅溶液	200	6 天	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500-1,000	7 天	1A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
	85%加保利可濕性粉劑	850-1,700	7天	1A
粉蝨類	20%達特南水溶性粒劑	3,000	3天	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4,000	12天	4A
螟蛾類、夜蛾類	35%白克松可濕性粉劑	3,000	15天	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3,000	6天	1A
	4.5%印棟素乳劑	1,000	—	
	2.15%因滅汀乳劑	2,000	18天	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5,000	9天	6
	25%免速達乳劑	500	10天	14
	50%免速達可濕性粉劑	1,000	6天	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14天	12A
	5%芬化利乳劑	2,000	10天	3A
	10%芬化利乳劑	3,000	10天	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6天	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	3,000	6天	5
	60% (30,000 DBMU/mg) 庫斯蘇力菌 E-911 可溼性粉劑	1000	—	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12天	4A, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18天	28
夜蛾類	18.4%剋安勃水懸劑	2500	12	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	12	28
植食性瓢蟲類	4.5%印棟素乳劑	1,000	—	
	2.15%因滅汀乳劑	2,000	18天	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5,000	9天	6
	25%免速達乳劑	500	10天	14
	50%免速達可濕性粉劑	1,000	6天	14
	25%汰芬隆水懸劑	750	14天	12A
	5%芬化利乳劑	2,000	10天	3A
	10%芬化利乳劑	3,000	10天	3A
	2.5%賜諾殺水懸劑	750	6天	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	3,000	6天	5
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12天	4A, 28



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期參考	作用機制代號
毒蛾類	60% (30,000 DBMU/mg) 庫斯蘇力菌 E-911 可溼性粉劑	1000	—	
	300g/L 賽速安勃水懸劑	3000	12 天	4A, 28
	20% 氟大滅水分散性粒劑	3000	18 天	28
鱗翅目 蝶蛾類	6%苦參鹼溶液	1500	—	
斑潛蠅類	75%賽滅淨可濕性粉劑	5,000	7 天	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7 天	17
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	15 天	4A

1. 一免訂容許量
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959