



不結球萵苣及半結球萵苣病蟲害防治藥劑

1.0 版 106.06.28 整理

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
苗立枯病	50%福多寧可溼性粉劑	2000	限苗期使用	7
	2x10 ⁸ cfu/g 綠木黴菌 R42 粉劑	1. 200 倍澆灌 2. 1 : 200 (w/w) 與介質混拌		
立枯病	23.2%賓克隆水懸劑	1000	15	20
	25%賓克隆可溼性粉劑	1000	15	20
葉斑病	10%保粒黴素(甲)可溼性粉劑	1000	—	19
	50%依普同可溼性粉劑	1000	6	2
	44%克收欣水懸劑	2500	10	11
	21.2%依滅列乳劑	1500	12	3
	75%四氯異苯腈可溼性粉劑	700	12	M5
葉枯病	21.2%依滅列乳劑	1500	12	3
	23%三泰隆乳劑	2000	15	3
	23%三泰隆水分散性乳劑	2000	15	3
露菌病	71.6%銅右滅達樂可溼性粉劑	600	3	4, M1
	50%達滅芬水懸劑	3000	6	40
	500G/L(50%W/V) 達滅芬水懸劑	3000	6	40
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	6	40
	60.8%氟比拔克水懸劑	1500	6(設施12)	43, 28
	23%亞托敏水懸劑	2000	6(設施12)	11
	250G/L(25%W/V) 亞托敏水懸劑	2000	6(設施12)	11



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	18.7%達滅克敏水分散性粒劑	1500	9	11, 40
	10%亞托敏水懸劑	900	10	11
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	11
	80%福賽得水分散性粒劑	500	12(設施18)	33
	39.5%普拔克溶液	400	12(設施18)	28
炭疽病	75%四氯異苯腈可溼性粉劑	600	7	M5
	75%四氯異苯腈水分散性粒劑	600	7	M5
	40%四氯異苯腈水懸劑	320	7	M5
	24.9%待克利乳劑	3000	7	3
	250 G/L (25% W/V)待克利乳劑	3000	7	3
	24.9%待克利水懸劑	3000	7	3
	10%待克利水分散性粒劑	1200	7	3
	23.6%百克敏乳劑	3000	9-21	11
菌核病	50%撲滅寧可溼性粉劑	2000	3	2
	50%貝芬同可溼性粉劑	1000	6	1, 2
	55%貝芬同可溼性粉劑	1000	6	1, 2
	50%大克爛可溼性粉劑	2000	7	14
	50%免克寧水分散性粒劑	1000	12	2
	50.5%快得依普同可溼性粉劑	800	21	1,2
疫病	1X10 ⁷ CFU/G 蓋棘木黴菌可溼性粉劑	2000	—	
	2.5%右滅達樂粒劑	20 公斤/公頃	限種植前使用	4



病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍 數	安全採 收期 (天)	作用機 制代號
	35%滅達樂水懸劑	3 公克加 10 毫升 水拌種	限 拌 種 用	4
	17.5%滅達樂溶液	每 公 斤 種 子 5 毫升	限 拌 種 用	4
	35%滅達樂可濕性粉劑	3 公克加 10 毫升 水拌種	限 拌 種 用	4
	35%滅達樂種子處理水分散 性粉劑	3 公克加 10 毫升 水拌種	限 拌 種 用	4
	50%達滅芬水懸劑	4000	6(設 施 12)	40
	50%達滅芬可溼性粉劑	4000	6(設 施 12)	40
	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	6(設 施 12)	43, 28
	18.7%達滅克敏水分散性粒 劑	1000	9(設 施 15)	11, 40
	23%亞托敏水懸劑	1000	10	11
	250G/L(25%W/V) 亞 托 敏 水懸劑	1000	10	11
白銹病	50%達滅芬水懸劑	3000	6	40
	500G/L(50%W/V) 達 滅 芬 水懸劑	3000	6	40
	50%達滅芬可溼性粉劑	3000	6	40
	10%亞托敏水懸劑	900	10	11
	23%亞托敏水懸劑	2000	10	11



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	250G/L(25%W/V) 亞托敏水懸劑	2000	10	11
	50%亞托敏水分散性粒劑	4500	10	11
	80%福賽得水分散性粒劑	500	12	33
銹病	84.2%三得芬乳劑	3500	6	5
白粉病	84.2%三得芬乳劑	3500	6	5
細菌性軟腐病	12.5%鏈黴素溶液	1000	—	25
	68.8%多保鏈黴素可溼性粉劑	1000	12	1,25
切根蟲	0.5%芬化利粒劑	50 公斤/公頃	定植前	3A
	3%加福松微粒劑	50 公斤/公頃	定植前	1B
	5%免扶克粒劑	30 公斤/公頃	定植前	1A
	5%陶斯松粒劑	30 公斤/公頃	10	1B
夜蛾類	3%蘇力菌可溼性粉劑	1500	—	11
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1000	—	11
	32,000IU/MG 蘇力菌水分散性粒劑	1000	—	11
	23.7%蘇力菌可溼性粉劑	1500	—	11
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	2.15%因滅汀乳劑	2000	6	6
	5%因滅汀乳劑	5000	6	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6



病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍 數	安全採 收期 (天)	作用機 制代號
	19.2G/L(1.92%W/V) 因滅汀乳劑	2000	6	6
	2.15%因滅汀水基乳劑	2000	6	6
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	6	3A
	13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A
	40%益滅賽寧可溼性粉劑	2500	6	1B, 3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可溼性粉劑	1500	6	3A
	10%賽滅寧可溼性粉劑	3000	6	3A
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	2.8%畢芬寧乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	10%克凡派水懸劑	1000	12	13
	70%得芬諾可溼性粉劑	3000	12	18
	19.7%得芬諾水懸劑	2000	12	18
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
	35%白克松可溼性粉劑	1000	15	1B
鱗翅目 害蟲 (蝶、蛾類)	6%苦參鹼溶液	1000	—	
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	10%克凡派水懸劑	1000	10	13
	5%芬化利乳劑	750	10	3A
	10%芬化利乳劑	1500	10	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
毒蛾類	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	25%二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
蚜蟲類	6%苦參鹼溶液	1500	—	
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1500	4	1A



病蟲害 別	藥劑名稱	稀釋倍 數	安全採 收期 (天)	作用機 制代號
	21%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	9	4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	9(設 施 15)	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	24.7%(W/V)賽速洛寧膠囊 水懸混劑	4000	12	3A, 4A
	20%免扶克乳劑	500	12	1A
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
薊馬類	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水 溶性袋裝	1500	4	1A
	5.87%賜諾特水懸劑	4000	6	5
	11.7%賜諾特水懸劑	8000	6	5
	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	6	5
	11.6%賜諾殺水懸劑	4500	6	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	80%賜諾殺可溼性粉劑	32000	6	5
	9.6%益達胺水懸劑	1500	6	4A
	9.6%益達胺溶液	1500	6	4A
	18.2%益達胺水懸劑	3000	6	4A
	28.8%益達胺溶液	4500	6	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6	4A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧可溼性粉劑	1500	6	3A
	10%賽滅寧可溼性粉劑	3000	6	3A
	1%賽洛寧可溼性粉劑	700	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	9	3A
	43%佈飛松乳劑	800	10	1B
	500G/L(50%W/V) 佈飛松乳劑	800	10	1B
葉部薊馬類	9.6%益達胺水懸劑	2000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	2000	9	4A
南黃薊馬	2.8%第滅寧乳劑	2000	20	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	20	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	2000	20	3A
粉蟲類	25%布芬淨可溼性粉劑	1500	6	16
	50%培丹水溶性粉劑	1000	6	14
	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	20%達特南水溶性粒劑	3000	7	4A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	150G/L(15%W/V) 賜派滅水分散性油懸劑	1500	7	23
	100G/L(10%W/V) 賜派滅水懸劑	1000	7	23
	9.6%益達胺溶液	1000-1500	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	9	4A
	2.8%畢芬寧乳劑	1000	9	3A
金花蟲類	25%二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
植食性瓢蟲類	25%二福隆可濕性粉劑	1500	14	15
斑潛蠅類	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	9(設施15)	4A
	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	43%佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
	500G/L(50%W/V) 佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
番茄斑潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2%阿巴汀水基乳劑	2000	6	6
葉蟬類	1%密滅汀乳劑	1500	6	6

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」/登記管理/病蟲害防治/蔬菜/小葉菜類/菊科小葉菜類/不結球萵苣與半結球萵苣



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959