



芹菜病蟲草害防治藥劑

113.03.20 更新

作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
根瘤線蟲	480g/L(48%w/v)氟速芬乳劑	每公頃 6 公升加水至 500 公升	種植前 7 天施用	
苗立枯病	2 × 10 ⁸ CFU/g 綠木黴菌 R42(其它)粉劑	與栽培介質混拌 (1 : 200) 再播種或以 200 倍液澆灌，擇一使用		
	50%福多寧可濕性粉劑	2000	限苗期使用	C2
	40%滅普寧水懸劑	800	限苗床使用	C2
	75%滅普寧可濕性粉劑	1500	限苗床使用	C2
	75%滅普寧可濕性粉劑	2 公克/公斤種子		C2
葉枯病	47%氫氧化銅水懸劑	800	7	M1
	21.2%依滅列乳劑	1500	12	G1
	23%三泰隆水分散性乳劑	2000	15	G1
	23%三泰隆乳劑	2000	15	G1
黑葉枯病	5×10 ⁹ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可濕性粉劑	600	-	
黑斑病	38%白列克敏水分散性粒劑	3000	10	C2, C3
黃萎病	98%邁隆粒劑	60 公克/平方公尺	限苗圃使用	N
	96.5%邁隆粒劑	60 公克/平方公尺	限苗圃使用	N
灰黴病	1×10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	600	-	
炭疽病	23.6%百克敏乳劑	3000	9	C3
	27.3%三氟得克利水懸劑	2500	12	C3, G1
疫病	60.8%氟比拔克水懸劑	1000	6(設施 12 天)	B5, F4
	50%達滅芬水懸劑	4000	6	H5



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	500g/L(50%w/v)達滅芬水懸劑	4000	6	H5
	50%達滅芬可濕性粉劑	4000	6	H5
	9.4%賽座滅水懸劑	3000	9(設施 15天)	C4
蚜蟲類	31.6%護賽寧乳劑	8500	15	3A
	10%賽速安水溶性粒劑	2000	6	4A
	25%賽速安水溶性粒劑	5000	6	4A
	1%密滅汀乳劑	1500	6	6
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5%w/v) 第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	6(設施 12)	4A,3A
	21.8%速殺氟水懸劑	6000	6	4C
	50%速殺氟水分散性粒劑	14000	6	4C
	20%達特南水溶性粒劑	2000	7	4A
	9.6%益達胺水懸劑	4000	9	4A
	9.6%益達胺溶液	4000	9	4A
	18.2%益達胺水懸劑	8000	9	4A
	28.8%益達胺溶液	12000	9	4A
	16%可尼丁水溶性粒劑	4000	9(設施 15)	4A
	20%亞滅培水溶性粒劑	6000	9	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	6000	9	4A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
20%免扶克乳劑	500	12	1A	
25%免扶克可濕性粉劑	700	12	1A	



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	40%免扶克水懸劑	1000	12	1A
	50%賽達松水基乳劑	1000	15	1B
	50%賽達松乳劑	1000	15	1B
鱗翅目害蟲	4.4%祿芬隆乳劑	1500	7	15
	50g/L(5% w/v)祿芬隆乳劑	1500	7	15
	34%硫敵克水懸劑	1000	6	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	2500	6	1A
	10%芬化利乳劑	1500	10	3A
	20%芬化利乳劑	3000	10	3A
	5%芬化利乳劑	750	10	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	10	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	3000	10	3A
夜蛾類	10%克凡派水懸劑	1000	10	13
	32000IU/MG 蘇力菌水分散性粒劑	1000	-	11A
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1000	-	11A
	23.7%蘇力菌可濕性粉劑	1500	-	11A
	3%蘇力菌可濕性粉劑	1500	-	11A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	50%馬拉松水基乳劑	500	4	1B
	25%馬拉松可濕性粉劑	250	4	1B
	50%馬拉松可濕性粉劑	500	4	1B
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	75%硫敵克可濕性粉劑	3000	6	1A
	10%賽滅寧可濕性粉劑	3000	6	3A
	5%賽滅寧可濕性粉劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧微乳劑	1500	6	3A
	5%賽滅寧乳劑	1500	6	3A
2.15%因滅汀水懸劑	1500	6	6	



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.15%因滅汀水基乳劑	1500	6	6
	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	19.2g/L(1.92%w/v)因滅汀乳劑	1500	6	6
	5%因滅汀乳劑	5000	6	6
	5%因滅汀水溶性粒劑	5000	6	6
	300g/L(30%w/v)賽速安勃水懸劑	3000	6	4A, 28
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	9	28
	35%剋安勃水分散性粒劑	5000	9	28
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	4000	9	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	800	9	3A
	20%芬化利可濕性粉劑	5000	10	3A
	5%芬化利乳劑	2000	10	3A
	50%培丹水溶性粉劑	1000	10	14
	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
	10%克凡派水懸劑	1000	10	13
	5%可芬諾水懸劑	1000	14	18
	25%汰芬隆水懸劑	750	14	12A
	50%汰芬隆水懸劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆水分散性粒劑	1500	14	12A
	50%汰芬隆可濕性粉劑	1500	14	12A
	10%芬化利乳劑	1500	14	3A
	20%芬化利水基乳劑	3000	14	3A
	20%芬化利乳劑	3000	14	3A



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
毒蛾類	300g/L(30%w/v)賽速安勃水懸劑	3000	6	4A, 28
	33%佈飛百滅寧乳劑	1000	10	1B, 3A
斑潛蠅類	2%阿巴汀乳劑	2000	6	6
	2.8%第滅寧乳劑	1000	6	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	6	3A
	25g/L(2.5%w/v)第滅寧乳劑	1000	6	3A
	75%賽滅淨可濕性粉劑	5000	7	17
	8.9%賽滅淨溶液	800	7	17
	43%佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
	500g/L(50%w/v)佈飛松乳劑	1000	7-15	1B
	0.5%可尼丁粒劑	60 公斤/公頃	9(設施 15)	4A
生長調節劑	40%勃激素 A3 水溶性粒劑	8000		
	2%勃激素 A3 溶液	400		
	4%勃激素 A3 溶液	800	3	
	3.1%勃激素 A3 可濕性粉劑	300-600		
促進成熟	20%勃激素 A3 水溶性片劑	4000	21	
	20%勃激素 A3 片劑	4000	採收前 3 星期用	
雜草	17.5%伏寄普乳劑	每公頃 1.5 公升稀釋至 600 公升	-	A
	34%施得圃乳劑	750-1000	-	K1
	38.7%施得圃膠囊懸著劑	900-1200	-	K1
	330g/L(33%w/v)施得圃乳劑	750-1000	-	K1



作物及病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	50%理有龍可濕性粉劑	-	-	C1
	23.5%復祿芬乳劑	800	-	E

1. “-” 表示免訂容許量
2. 如有錯誤，以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959