



酪梨病蟲害防治藥劑

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
炭疽病	40%甲基多保淨水懸劑	500	6	B1
	70%甲基多保淨可溼性粉劑	1000	6	B1
	40%腐絕可濕性粉劑	1000	6	B1
	41.8%腐絕水懸劑	1000	6	B1
	10%亞托敏水懸劑	800	6	C3
	23%亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	250 G/L (25% W/V) 亞托敏水懸劑	2000	6	C3
	50%亞托敏水分散性粒劑	4000	6	C3
	23.6%百克敏乳劑	3000	12	C3
	23.6%百克敏水懸劑	3000	12	C3
	50%三氟敏水分散性粒劑	4000	18	C3
	500 G/L (50% W/V) 三氟敏水懸劑	4000	18	C3
	500 G/L (50% W/V) 三氟派瑞水懸劑	4000	18	C3、C2
	39.5%扶吉胺水懸劑	2000	9	C5
	25.9%得克利水基乳劑	1500	6	G1
	250 G/L (25% W/V) 得克利水基乳劑	1500	6	G1
	325 G/L (32.5% W/V) 亞托待克利水懸劑	3000	21	C3;G1
	80%免得爛水分散性粒劑	500	21	M3
	40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可溼性粉劑	1500	21	M7



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑	2000	6	D1、E2
疫病	700PCU/g 純白鏈黴菌素水溶性粉劑	800	-	D4
	52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	1500	12	C3、un01
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	800	-	M1
	76.5%銅滅達樂可濕性粉劑	1000	12	A1、M1
	76.5%銅右滅達樂可濕性粉劑	1000	12	A1、M1
白粉病	52%可濕性硫黃水懸劑	800 倍	-	un
	80%可濕性硫黃水分散性粒劑	1200 倍	-	un
	75%可濕性硫黃可濕性粉劑	1200 倍	-	un
	80%可濕性硫黃可濕性粉劑	1200 倍	-	un
	90%可濕性硫黃可濕性粉劑	1400 倍	-	un
	95%可濕性硫黃可濕性粉劑	1400 倍	-	un
葉蟎類	10%芬普寧水懸劑	1000	12	3A
	10%得芬瑞可溼性粉劑	2000	6	21A
	18.3%芬殺蟎水懸劑	3000	12	21A
	10%芬殺蟎乳劑	1500	12	21A
	15%芬殺蟎水懸劑	2500	12	21A
	30%賜派芬水懸劑	2500	6	23



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	240 G/L (24% W/V)賜滅芬水懸劑	2000	7	23
	20%賽芬蟎水懸劑	2000	12	25
	39.5%扶吉胺水懸劑	1500	9	C5
薊馬類	50%陶斯松可溼性粉劑	2000	9	1B
	50%陶斯松水基乳劑	2000	9	1B
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	9	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	18.2%益達胺水懸劑	2000	12	4A
	9.6%益達胺溶液	1000	12	4A
	28.8%益達胺溶液	3000	12	4A
	9.6%益達胺水懸劑	1000	12	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	7	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	10	4A
	37%第滅達胺水懸劑	2000	12	3A,4A
	11.7%賜諾特水懸劑	3200	12	5
5.87%賜諾特水懸劑	1600	12	5	
粉介殼蟲類 ; 軟介殼蟲類	40.8%陶斯松乳劑	2000	15	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	2000	15	1B
	20%達特南水溶性粒劑	2000	10	4A
	20%亞滅培水溶性粉劑	2500	7	4A
	50%速殺氟水溶性粒劑	7500	14	4C
	21.8%速殺氟水懸劑	3000	14	4C



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑	4000	9	3A,4A
	100 G/L (10% W/V)賜派滅水懸劑	1500	10	23
	100 G/L (10% W/V)賜派滅水分散性油懸劑	2500	10	23
	95%礦物油乳劑	200	-	NC(未分類)
	97%礦物油乳劑	200	-	NC(未分類)
	99%礦物油乳劑	200	-	NC(未分類)
斑潛蠅類	40%三落松乳劑	1000	14	1B
鱗翅目害蟲	2.4%第滅寧水懸劑	2000	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	2000	9	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	9	3A
夜蛾類	22.5%陶斯松乳劑	1000	9	1B
	25%陶斯松可濕性粉劑	1000	9	1B
	40.8%陶斯松乳劑	1800	9	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1800	9	1B
	44.9%陶斯松乳劑	2000	9	1B
	50%陶斯松可濕性粉劑	2000	9	1B
	50%陶斯松水基乳劑	2000	9	1B
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	9	3A



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	12	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	12	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	12	3A
	10%克凡派水懸劑	1000	12	13
毒蛾類	22.5%陶斯松乳劑	1000	9	1B
	25%陶斯松可濕性粉劑	1000	9	1B
	40.8%陶斯松乳劑	1800	9	1B
	40.8%陶斯松水基乳劑	1800	9	1B
	44.9%陶斯松乳劑	2000	9	1B
	50%陶斯松可濕性粉劑	2000	9	1B
	50%陶斯松水基乳劑	2000	9	1B
	2.8%賽洛寧乳劑	2000	9	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	2000	9	3A
	2.5%賽洛寧微乳劑	2000	9	3A
	5%賽洛寧水分散性粒劑	3500	9	3A
	1%賽洛寧可濕性粉劑	700	9	3A
	2.8%賽洛寧水懸劑	2000	9	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1000	12	3A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1000	12	3A
	2.4%第滅寧水懸劑	1000	12	3A
	11.7%賜諾特水懸劑	2000	12	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1000	12	5
10%克凡派水懸劑	1000	12	13	
東方果實蠅	0.02%賜諾殺濃餌劑	8	3	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
雜草	13.5%固殺草溶液	稀釋至 600 公升	-	H
	18.02%固殺草溶液	稀釋至 800 公升	-	H

1. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治
2. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959

1.8 版 110.05.26 更新