



番茄病蟲害防治藥劑

1.0 版 100.05.11 整理
 1.1 版 100.08.29 整理
 1.2 版 100.10.13 整理
 1.3 版 101.03.29 更新
 1.4 版 101.12.17 更新
 1.5 版 103.02.21 更新

病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
根瘤線蟲	10% 毆殺滅粒劑	依 公 頃 施 用 量 使用	種植前施用	1A
	10% 托福松粒劑			1B
	45% 普伏松乳劑			1B
	10% 福賽絕粒劑			1B
	10% 芬滅松粒劑			1B
	3% 加保扶粒劑			1A
	80% 滅線蟲乳劑			
	10% 毆殺滅溶液	200		1A
	75% 福賽絕乳劑*	600-10 00		1B
晚疫病	250g/L 曼普胺水懸劑	2500	15(設施 21)	F5
	17.7% 安美速水懸劑	4000	6(設施 12)	C4
	18.7% 達滅克敏水分散性粒劑	1000	6(設施 12)	F5,C3
	23% 亞托敏水懸劑	1000	6	C3
	52.5% 凡殺克絕水分散性粒劑	2500	6	C3,27
	9.4% 賽座滅水懸劑	3000	6	C4
	50% 達滅芬可濕性粉劑	4000	6	F5
	70% 甲基鋅乃浦可濕性粉劑	500	7	M3
	75% 四氯異苯腈水分散性粒劑	600	7	M5
	75% 四氯異苯腈可濕性粉劑	600	7	M5
	33% 鋅錳乃浦水懸劑	600	6	M3
	72% 鋅錳克絕可濕性粉劑	500	7	M3
	53% 鋅錳右滅達樂水分散性粒劑	400	21	M3,4



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	58% 鋅錳滅達樂可溼性粉劑	400	21	M3,4
	80% 錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	80% 免得爛可濕性粉劑	500	7	M3
	80% 鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	7	M3
	63.02% 鹼性氯氧化銅水分散性 粒劑	400	—	M1
疫病	23% 亞托敏水懸劑	1000	6(設施 12)	C3
	50% 達滅芬可濕性粉劑	4000	6(設施 12)	F5
	250g/L 曼普胺水懸劑	2500	15(設施 21)	F5
	52.5% 凡殺克絕水分散性粒劑	2500	6	11,C3; 27,un01
早疫病	37.5% 氫氧化銅水懸劑	400-80 0	—	M1
	77% 氫氧化銅可濕性粉劑	800	6	M1
	57.6% 氫氧化銅水分散性粒劑	1200	—	M1
	81.3% 嘉賜銅可濕性粉劑	1000	3	D3, M1
	10% 保粒黴素(甲)可濕性粉劑	800	—	H4
	58% 松香酯銅乳劑	1500	6	M1
葉黴病	80% 錳乃浦可濕性粉劑	400	7	M3
	80% 鋅錳乃浦可濕性粉劑	500	7	M3
灰黴病	23.7% 依普同水懸劑	1000	6	E3
	50% 撲滅寧可濕性粉劑	2000	6	E3
幼苗疫病	35% 依得利可濕性粉劑	3000	限苗期使用	F3
	25% 依得利乳劑	1500	限苗期使用	F3
	66.5% 普拔克溶液	400	限苗期使用	28,F4
	35% 依得利可濕性粉劑	2000	播種當日使用	F3
	25% 依得利乳劑	1500	播種當日使用	F3
苗立枯病	5% 本達樂粒劑	0.6 公	限苗期使用	A1



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
		斤 / 公 頃		
白絹病	50%福多寧可濕性粉劑	5000	限苗期使用	C2
	50%撲滅寧可濕性粉劑	2000	限苗期使用	E3
細菌性斑 點病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1000	6	D3, M1
	53.8%氫氧化銅水分散性粒劑	2000	6	M1
	61.4%氫氧化銅水分散性粒劑	1500	—	M1
	27.12%三元硫酸銅水懸劑	500	3	M1
白粉病	99%礦物油乳劑	500	—	
炭疽病	22.7%腈硫醃水懸劑	700	4	M9
	23.6%百克敏乳劑	3000	6	C3
番茄夜蛾	34%硫敵克水懸劑	1000	3	1A
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
	58%乃力松乳劑	1000	4	1B
	40%納乃得水溶性粒劑	1500	4	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1500	4	1A
	25%納乃得水溶性粉劑	900	4	1A
	14.5%因得克水懸劑	2000	6	22A
	2.8%第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	1500	6	3A
	40%益滅賽寧可濕性粉劑	2500	6	3A,
	44.9%陶斯松乳劑	1000	6	1B
	50%陶斯寧乳劑	1500	6	1B, 3A
	2.15%因滅汀乳劑	1500	6	6
	4.4%祿芬隆乳劑	1500	6	15
13.5%納得亞滅寧乳劑	1000	6	1A, 3A	



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	85%加保利可濕性粉劑	850	7	1A
	10%克凡派水懸劑	1000	9	13
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	10%諾伐隆乳劑	1500	12	15
	300g/L 賽速安勃水懸劑	4000	6	4A,28
	5%克福隆乳劑	2000	15	15
甜菜夜蛾	2.5%畢芬寧水懸劑	1500	10	3A
	2.8%畢芬寧乳劑	1500	10	3A
夜蛾類、 毒蛾類	35%白克松可濕性粉劑	3000	15	1B
	2.5%賽洛寧微乳劑	1000	10	3A
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液	1000	10	3A
	2.8%賽洛寧乳劑	1000	10	3A
	75%硫敵克可濕性粉劑	4000	3	1A
	50%馬拉松乳劑	500	4	1B
夜蛾類	10%諾伐隆水分散性乳劑	1500	12(設施 18)	15
粉蟲類	20%亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	20%達特南水溶性粒劑	3000	3	4A
	10.4%貝賽益達胺水懸劑	2000	6	3A, 4A
	40.4%賽果培水懸劑	3300	10	4A
	10%氟尼胺水分散性粒劑	3000	6(設施 12)	9C
番茄斑潛 蠅	2%阿巴汀乳劑	1000	12	6
	75%賽滅淨可濕性粉劑	4000	12	17
	8.9%賽滅淨溶液	1000	12	17
薊馬	2.5%賜諾殺水懸劑	1000	3	5



病蟲害別	藥劑名稱	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	作用機 制代號
	2.8% 第滅寧乳劑	1500	6	3A
	2.8% 第滅寧水基乳劑	1500	6	3A
	9.6% 益達胺溶液	2000	6	4A
	9.6% 益達胺水懸劑	2000	6	4A
	25% 福化利乳劑	3000	7	3A
	2.9% 貝他-賽扶寧乳劑	1500	9	3A
	43% 佈飛松乳劑	800	10	1B
	20% 亞滅培水溶性粉劑	4000	6(設施 12)	4A
	2.5% 賽洛寧微乳劑	2000	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	2000	6	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	2000	6	3A
	50% 滅賜克可濕性粉劑	800	15	1A
切根蟲	5% 陶斯松粒劑	30 公 斤 / 公 頃	種植前施用	1B
	3% 加福松微粒劑	50 公 斤 / 公 頃		1B
葉蟎類	2.5% 賽洛寧微乳劑	1000	6	3A
	2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	1000	6	3A
	2.8% 賽洛寧乳劑	1000	6	3A
	20% 畢達本可濕性粉劑	3000	12(設施 18)	21A
	20% 畢達本水懸劑	3000	12(設施 18)	21A
	1% 密滅汀乳劑	1500	3(設施 9)	6

*75%福賽絕乳劑於 103 年 1 月 1 日禁止製造、加工、輸入，104 年 1 月 1 日禁止銷售。

1. 一免訂容許量
2. 上述資料更新日期為 2014 年 2 月 21 日，如有錯誤，以主管機關公告為準。



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治

3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959